10. Karl-Stolte-Seminar zur Pädiatrischen Diabetologie

Eine Dekade Karl-Stolte-Seminar: Tradition und Fortschritt

Endgültiges Programm

10. Januar und 11. Januar 2014
Courtyard Hotel und NDR-Funkhaus Hannover

11. Karl-Stolte-Seminar zur Pädiatrischen Diabetologie

**Mit Diabetes fit für das Leben –
Wunsch und Wirklichkeit**

Einladung

**30. und 31. Januar 2015
Courtyard Hotel und NDR-Funkhaus Hannover**

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wir freuen uns, Sie heute zum 10. Karl-Stolte-Seminar zur Pädiatrischen Diabetologie und Endokrinologie willkommen zu heißen. Der Pädiater Prof. Karl Stolte (1881-1951) entwickelte ab 1929 in der Breslauer Universitäts-Kinderklinik sein Konzept einer flexiblen Behandlung des Diabetes mellitus unter der Bezeichnung der „freien Diät“. Diesmal blicken wir auf die 10jährige Tradition zurück, dass sich kinderdiabetologische Teams in Hannover zu einem Seminar treffen, das dem Andenken an Prof. Stolte gewidmet ist. Dies bietet die Möglichkeit einer Bilanz über eine Dekade der Entwicklung in der Kinderdiabetologie und wird Ihnen wieder ein Forum zum Austausch über aktuelle „heiße Eisen“ auf dem Gebiet der Kinderdiabetologie und -endokrinologie bieten.

Weil das Sprengel-Museum immer noch umgebaut wird, treffen wir uns diesmal wieder im benachbarten Saal der NDR-Radiophilharmonie. Das nahegelegene Courtyard Marriott-Hotel ist wie immer Schauplatz der Seminare und des gemütlichen Beisammenseins. Neben Vorträgen über aktuelle medizinische und gesundheitspolitische Entwicklungen wollen wir wieder in Seminaren den direkten Austausch unter den kinderdiabetologischen Teams unterstützen. Damit der interaktive Charakter der Veranstaltung erhalten bleibt, haben wir uns entschieden, die Teilnehmerzahl nicht zu erhöhen. Wir treffen uns am Freitagnachmittag um 16:00 Uhr zu ersten Vorträgen. Nach einem gemeinsamen Abendessen mit Dämmerstoppchen bietet sich die Gelegenheit, aktuelle Themen mit den Referenten in entspannter Atmosphäre vertieft zu diskutieren. Auch der folgende Samstag ist durch eine Kombination aus Vorträgen und darauf bezogenen Seminaren gekennzeichnet.

Wir sind überzeugt, dass wir kompetente Referenten zu aktuellen Themen gewinnen konnten. Der kleine Sendesaal im NDR Funkhaus als neuer Veranstaltungsort und das nahegelegene Courtyard Marriott-Hotel werden uns einen attraktiven Rahmen bieten. Wir begrüßen Sie recht herzlich in Hannover und wünschen uns einen lebhaften Erfahrungsaustausch.

Für das Team am Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT und der MHH

Prof. Dr. Thomas Danne

Prof. Dr. Karin Lange

Programm Freitag, 10.1.2014

16.00 bis 19.30 Uhr

Veranstaltung im NDR Funkhaus

Begrüßung: Karin Lange und Thomas Danne

**Behandlungsziele in verschiedenen Altersgruppen:
HbA1c, glykämische Variabilität, Vermeidung
schwerer Hypo's, Lebensqualität....** 16.00-16.30

Bilanz der letzten 10 Jahre

Olga Kordonouri, Hannover

**Verordnung von Pumpen und Sensoren –
State of the Art** 16.30-17.00

Ralph Ziegler, Münster

Kaffeepause 17.00-17.30

**Kinder mit Diabetes in Hort und Schule -
welche Strategien sind erfolgreich?** 17.30-18.30

Podiumsdiskussion: Moderation Karin Lange, Hannover

- aus der Sicht der Diabetesberaterin
Sarah Bläsig, Hannover
- aus der Sicht der Schulärztin
*Britta Schunter, Region Hannover, Sozialpädiatrie und
Jugendmedizin, Hannover*
- aus der Sicht des Kultusministeriums
Teilnahme abgesagt
- aus der Sicht eines Lehrers
*Oliver Bischoff, stellvertretender Schulleiter, Astrid Lindgren Schule,
Ilse*
- aus der Sicht der Krankenkassen
*Heike Sander, Landesgeschäftsführerin der Barmer GEK,
Niedersachsen, Bremen*

**Extremsport mit Typ 1 Diabetes:
the Kilimanscharo – Experience** 18.30-19.30

Delphine Arduini, Paris

Gemeinsamer Fußweg zum

Abendessen und Dämmerchoppen im Hotel Courtyard Marriott

Programm Samstag, 11.1.2014

9.00 bis 14.15 Uhr

Seminare im Hotel Courtyard Marriott

Seminarblock 1

09.00-10.00

- Trinken und Diabetes: Beratung zu Light-Getränken, Obstsäften und Alkohol in der Pädiatrie
Evelin Sadeghian, Anika Bokelmann, Hannover
- Was kann man Kindern in der Diabetestherapie zumuten?
Claudia Ziegler, Heike Saßmann, Hannover
- Closed-loop: wie funktioniert das praktisch?
Maryam Fath, Sarah Bläsig, Hannover
- Soziale Medien und Diabetes: Wegweiser durch Computerprogramme und Apps für Kinder und Jugendliche mit Diabetes
Kerstin Remus, Kerstin Semler, Anne Nieswandt, Kerstin Schnell, Hannover
- Die neuen und überarbeiteten pädiatrischen Schulungsprogramme
Karin Lange, Wolfgang von Schütz, Hannover

Seminarblock 2

10.15-11.15

Themen wie oben im Seminarblock 1

Nach den Seminaren gemeinsamer Fußweg zum

NDR-Funkhaus

Pause mit Mittagsbuffet im NDR-Funkhaus

11.30-12.30

The future of glucose sensing

Tadej Battelino, Ljubliana, Slovenien

12.30-13.15

Hypoglykämie bei Typ 1 Diabetes – von Spatzen und Kolibris

Karin Weissenborn, Hannover

13.15-13.45

Nicht nur Insulin – neue Medikamente zur Behandlung des Typ 1 Diabetes

Thomas Danne, Hannover

13.45-14.15

Die Veranstaltung wird von der Ärztekammer Niedersachsen mit , CME-Punkten und dem Verband der Diabetes Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland e. V. zertifiziert.

Bei Rückfragen erreichen Sie uns über:

Tel: 0511 / 8115 - 3331

Fax: 0511 / 8115 - 3334

E-Mail: stolte@hka.de

Veranstaltungsort:

KLEINER SENDESAAL

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK

- Landesfunkhaus Niedersachsen -

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22,

30169 Hannover

www.ndr.de

Veranstalter:

Kinder- und Jugendkrankenhaus
„AUF DER BULT“
Diabeteszentrum für
Kinder und Jugendliche
Janusz-Korczak-Allee 12
30173 Hannover

ALLGEMEINE KINDERHEILKUNDE
DIABETOLOGIE, ENDOKRINOLOGIE,
KLINISCHE FORSCHUNG

**AUF
DER
BULT**

KINDER- UND
JUGEND-
KRANKENHAUS

Die Veranstaltung wird von einer Industrieausstellung begleitet.

Wir danken allen Ausstellern und Sponsoren für die freundliche Unterstützung.

Medtronic GmbH	10.000,00 €
Novo Nordisk Pharma GmbH	10.000,00 €
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	5.000,00 €
Abbott GmbH & Co. KG	1.100,00 €
Bayer Vital GmbH	1.100,00 €
LifeScan	1.100,00 €
Lilly Deutschland GmbH	1.100,00 €
Nintamed GmbH & Co. KG	1.100,00 €
Roche Diagnostics Deutschland GmbH	1.100,00 €
STADAVita GmbH	1.100,00 €
Ypsomed GmbH	1.100,00 €

Ansprechpartner im Diabetes Zentrum für Kinder und Jugendliche am Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT

Terminvereinbarung	ambulant	0511/8115-3335 oder 3330
	stationär (Pumpen- oder Sensoreneinstellung)	0511/8115-3351 oder 2209

.....

Die Mitglieder des Diabetesteam sind unter folgenden Telefonnummern zu erreichen:

Chefarzt	Prof. Dr. T. Danne	0511/8115-3330
Chefärztin	Prof. Dr. O. Kordonouri	0511/8115-3340
Oberärztin	Dr. N. Datz	0511/8115-3333
Oberärztin	PD Dr. S. Heger	0511/8115-3331
Oberärztin	Dr. Schnell	0511/8115-3341
Oberarzt	K. - P. Schubert	0511/8115-3338
	Dr. W. von Schütz	0511/8115-3332 (nur Montag- und Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag)
Assistenzärztin	M. Fath	0511/8115-3501
Assistenzärztin	C. Tsioli	0511/8115-4527
Assistenzarzt	T. Biester	0511/8115-4527
Diabetesberatung	S. Bläsig	0511/8115-2290 oder 2209
	C. Krowicky	0511/8115-3351 oder 2209
	K. Remus	0511/8115-2290 oder 2209
	M. Würsig	0511/5115-2290 oder 2209
	A. Nieswandt	0511/8115-3350
Ernährungsberatung	E. Sadeghian	0511/8115-3350
	A. Bokelmann	0511/8115-3350
Psychologie	Dr. rer. biol. hum. C. Ziegler	0511/8115-2401
Arzthelferin Diabetesambulanz	S. Glinda	0511/8115-3335
Arzthelferin Adipositas	M. Zärtner	0511/8115-3343
Studienkoordinatorin	Dr. B. Aschemeier, PH	0511/8115-3342
Studienschwester	E. Marquardt	0511/8115-3336
SWEET-Projektkoordinatorin	Dr. rer. nat. K. Klee	0511/8115-3337
Teamassistentin	A. Kukkonen	0511/8115-3331
Fax der Arbeitsgruppe		0511/8115-3334

.....

Kontaktadresse: Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT
Diabetes Zentrum für Kinder und Jugendliche
Janusz-Korczak-Allee 12
30173 Hannover

O. Kordonouri, Hannover

Behandlungsziele in verschiedenen Altersgruppen:

Bilanz der letzten 10 Jahre

AUF DER BULT
KINDER- UND JUGENDKRANKENHAUS

Eine Debatte Karl Stoffs Seminar: Tradition und Fortschritt

Behandlungsziele in verschiedenen Altersgruppen: Bilanz der letzten 10 Jahre

Olga Kordonouri
Email: kordonouri@hka.de

Was hat sich geändert ? Was ist geblieben ?

10 Jahre nach der DCCT-Studie

Glycosylated Hemoglobin (%)

Year of Study

Rate of Severe Hypoglycemia (per 100 patient-years)

Glycosylated Hemoglobin (%)

Die Effektivität der intensivierten Insulintherapie (ICT) bei Patienten mit T1D ist etabliert

Das hohe Hypoglykämierisiko bei ICT verhindert oft eine nah-normoglykämische Stoffwechsellaage

DCCT, N Engl J Med 1993; 329: 977-986

Schematische Darstellung der Insulinpumpentherapie (CSII)

Pickup J. *N Engl J Med* 2012; 366:1616-24

Gerade bei den jüngeren Kindern findet die Insulinpumpentherapie ihren schnellen Einsatz

Berghäuser MA et al. *Pediatric Diab* 2008; 9:590-5

Bachran R et al. *Pediatric Diab* 2012; 13:1-5

Die Insulinpumpentherapie ist der Spritzen Therapie auch bei Kindern überlegen

Continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) versus multiple insulin injections for type 1 diabetes mellitus (Review)

Issue 95, Update 82 Page 16, 17 (Issue 95, New 2)

- Analyse von 23 RCTs bei 976 Patienten mit T1D
- Patienten mit CSII haben im Durchschnitt einen um -0,3% [95% Konfidenzintervall: 0.1 bis -0,4%] besseren HbA1c-Wert als solche mit ICT
- Schwere Hypoglykämien sind seltener bei Patienten mit CSII
- CSII wird von Patienten vorgezogen als ICT
- Keine signifikanten Unterschiede beim Gewicht

Pankowska E et al. *Pediatric Diab* 2009; 10:52-8

HbA1c und DKA-Prävalenz bei Kindern und Jugendlichen mit T1D in Deutschland

Rosenbauer J et al. Diabetes Care 2012;35:80-86

Unerreichbares Behandlungsziel für viele Patienten mit T1D

HbA1c
7.5%

Lebensqualität und Stoffwechsellage bei Patienten mit T1D: Henne oder Ei?

Gute Korrelation zwischen Allgemein- und krankheitsspezifischer Lebensqualität

Negative Korrelation zwischen HbA1c und krankheitsspezifischer Lebensqualität

Pickup J & Harris A. J Diabetes Sci Technol. 2007; 1: 394-9

**Die künstliche Bauchspeicheldrüse:
technische Lösung statt Heilung**

Glucose Sensor: Misst Zucker im Gewebe

Insulin: Kommt über Katheter in den Körper

Transmitter: Sendet Werte an Pumpe

Laptop: Berechnet Insulinosis und steuert Pumpe ohne dass der Patient eingreifen muss

Insulinpumpe: gibt fehlendes Insulin bedarfsgerecht ab

Algorithmen für Closed-Loop:
PID (Proportional, Integral and Derivative)
MPC (Model Predictive Control)
HPA (Hypoglycemic Predictive Algorithm)
MD-Logic Algorithm

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

AUF DER BULT
KINDER- UND JUGEND-GERIATRIE

**The Cambridge Artificial Pancreas Project:
A Treatment Option for Adolescents**

Roman Hovorka et al.
*Institute of Metabolic Science and
 Department of Paediatrics,
 University of Cambridge, UK*

Model predictive control (adaptive)

plasma glucose

actual measurements

insulin infusion

learn model parameters

past control

control time t_{i+1}

Die Insulinabgabe erfolgt durch entsprechende Anpassung der Basalrate

Roman Hovorka et al.

- ### Zusammenfassung
- Die intensivierte Insulintherapie ist die Therapie der Wahl bei jedem Kind mit Typ-1 Diabetes
 - Ziel ist, die best mögliche Stoffwechsellage ohne schwerwiegende Hypoglykämien und mit wenigen Blutzuckerschwankungen zu erreichen
 - Eine einheitliche Behandlungsphilosophie des Diabetesteam ist grundlegende Voraussetzung für gute Therapieergebnisse
 - Mit Patient und seiner Familie müssen individuelle Therapieziele ausformuliert werden
 - Die Anwendung von modernen Therapieformen (Insulinpumpe, CGM) nimmt kontinuierlich zu
 - Der Einsatz moderner Technologien kann das Erreichen der individuellen Behandlungsziele ermöglichen
 - Basis- und Folgeschulungen sind das A und O der Diabetestherapie
 - Die Diabetestherapie ist eine Teamaufgabe und -arbeit

R. Ziegler, Münster

Verordnung von Pumpen und Sensoren – State of the Art

Verordnung von Pumpen und Sensoren – State of the Art

Dr. med. Ralph Ziegler
Diabetologische Schwerpunktpraxis für Kinder und Jugendliche
ext. Oberarzt päd. Diabetologie St. Franziskus-Hospital
Münster
rz@ziegler-muenster.de

Insulintherapie bei Kindern und Jugendlichen mit T1D DPV Daten

[Insulinpumpentherapie bei Kindern und Jugendlichen](#)

insgesamt : ca. 50%

Alter unter 6 J.: ca.85%

Höll R. Deutsche Gesundheitsberichterstattung Diabetes 2014

DR. R. ZIEGLER und KOLLEGEN, Diabetologische Schwerpunktpraxis für Kinder u. Jugendliche, Münster

Indikationen / Kontraindikationen zur Insulinpumpe?

**grundsätzlich keine Kontraindikationen
aus medizinischer Sicht !!!**

evtl. aus psychosozialer Sicht:
nicht schulbar
psychiatrische Erkrankung
Suizidgefahr

Indikationen

Kinder unter 6 Jahre
Kinder mit einem Basalinsulinbedarf von $\leq 10E/die$

Dawn-Phänomen
Hypoglykämien
HbA1c ausserhalb des Zielbereiches

„und alle anderen“

Indikationen zur Insulinpumpe:
Ergänzender Begutachtungseleitfaden für den MDK

Grundlagen der Begutachtung

Ergänzender Begutachtungseleitfaden zum Begutachtungseleitfaden „Begutachtung der Versorgung mit Insulin“

Insulinpumpen bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1

In diesem Leitfaden sind mögliche Indikationen und die geforderten Nachweise für einen Pumpenantrag zusammengestellt.

Der Leitfaden dient als Orientierung für den jeweiligen MDK-Gutachter.

Er ist nicht abschließend oder verbindlich.

Der MDS berät den GKV-Spitzenverband und koordiniert die Medizinischen Dienste ... Der MDS berät den GKV-Spitzenverband in allen medizinischen Versorgungs-, Leistungs- und Strukturfragen der Krankenversicherung ... koordiniert der MDS die fachliche Arbeit der Medizinischen Dienste in der Beratung und Begutachtung und fördert ein einheitliches Vorgehen

Stand 01. August 2012

Anträge zur Insulinpumpenversorgung

Genehmigungsanträge:

- Anträge müssen vollständig und plausibel sein mit **korrekten Indikationen**
- Es können „individualisierte“ Textbausteine genutzt werden
- korrekte und **aussagekräftige Dokumentation** beifügen
- Eltern / Familien / Patienten haben **Mitwirkungspflicht**, auch den Teams gegenüber
- unbedingt **Widerspruch** wenn begründet

Hilfen auf der homepage der Arbeitsgemeinschaft pädiatrische Diabetologie, AGPD, unter www.diabetes-kinder.de

Indikationen zur Insulinpumpe lt. Leitfaden MDK

1. Kleine Kinder, besonders Neugeborene, Säuglinge und Vorschulkinder
Bei einem Insulinbedarf von < 10 IE /24 Stunden ist die adäquate Insulinversorgung mit den verfügbaren Insulinen mit einem erheblichen Aufwand verbunden (Verdünnung) bzw. aufgrund der Pharmakokinetik in der Regel nicht hinreichend möglich. Darüber hinaus sind Nahrungsaufnahme und körperliche Aktivität nur schwer planbar/voraussehbar.

Die Einleitung der CSII ist medizinisch indiziert.

2. Kinder und Jugendliche mit ausgeprägtem Blutzuckeranstieg in den frühen Morgenstunden (Dawn-Phänomen)
Ein, nach Ausschöpfung aller im Rahmen der ICT (Wechsel der Verzögerungsinsuline (VI), Anpassung des Zeitpunktes der Injektion des VI (spät abends)) zur Verfügung stehenden Therapieoptionen, nicht hinreichend beeinflussbares Dawn-Phänomen stellt eine **medizinische Indikation zur (zunächst probatorischen) Insulinpumpentherapie** dar.

Indikationen zur Insulinpumpe lt. Leitfaden MDK

3. Schwere Hypoglykämien, rezidivierende und nächtliche Hypoglykämien (trotz intensiver konventioneller Therapie = ICT)

Nach Ausschöpfung aller im Rahmen der ICT zur Verfügung stehenden Therapieoptionen (z.B. Wechsel der Insuline, Dosisanpassung im Rahmen des Basalratentestes / Teilfasten) weiterhin auftretende, über das zu erwartende Maß hinausgehende rezidivierende oder schwere und/oder nächtliche Hypoglykämien stellen - insbesondere im Falle nachgewiesener Hypoglykämiewahrnehmungsstörungen - eine Indikation zur (zunächst probatorischen) Insulinpumpentherapie dar.

4. HbA1c-Wert außerhalb des Zielbereichs (trotz ICT)

Ein HbA1c-Wert außerhalb des Zielbereichs wie auch wiederholt erhöhte HbA1c-Werte stellen primär keine medizinische Indikation zur Pumpenversorgung dar. Ausschlag gebend ist die aussagekräftige Dokumentation der Stoffwechselslage und aller für die zielgerichtete Stoffwechselführung notwendigen Parameter. Ist anhand dieser zu erkennen, dass der HbA1c-Wert Ausdruck einer - auch nach dokumentierter Ausschöpfung aller im Rahmen der ICT zur Verfügung stehenden Therapieoptionen - bestehenden Stoffwechsellage ist, ist eine medizinische Indikation zur Einleitung der CSII gegeben.

Indikationen zur Insulinpumpe lt. Leitfaden MDK

10. Große Fluktuationen des Blutzuckers unabhängig vom HbA1c-Wert (trotz ICT)

Fluktuationen des Blutzuckers bedürfen einer subtilen Abklärung. Dazu gehören auch einfache Maßnahmen wie Inspektion / Wechsel der Injektionsstellen (Lipohypertrophien mit entsprechenden Resorptionsstörungen bestehen bei mehr als einem Drittel der Typ 1- Diabetiker!) und Überprüfung der Grundkenntnisse zur Insulintherapie (einschließlich Handhabung des Insulins und der Insulininjektionen), Überprüfung von Motivation / Compliance, Überprüfung der Basalinsulindosierung und der Einheiten- / BE-Verhältnisse). Bestehen nach Ausschluss abwendbarer Ursachen und ggf. Anpassung der ICT weiterhin große Blutzuckerfluktuationen, besteht eine nachvollziehbare **medizinische Indikation zur (zunächst probatorischen) Einleitung einer Insulinpumpentherapie**.

Indikationen zur Insulinpumpe lt. Leitfaden MDK

6. Einschränkung der Lebensqualität durch bisherige Insulinbehandlung

Die angenommene bzw. erwartete Verbesserung der Lebensqualität allein kann unter Berücksichtigung des § 33 SGB V **nicht als Indikation für die Einleitung einer Insulinpumpentherapie gelten**. Maßgebend ist zunächst die Verbesserung medizinischer Behandlungsziele (Verringerung der Mortalität und Verbesserung der Morbidität).

9. Leistungssportler

Das Ausüben von Leistungssport entspricht nicht der üblichen Lebensführung und somit nicht den Grundbedürfnissen des täglichen Lebens (Bundessozialgerichts Urteil vom 25. 06.2009: Az.: B 3 KR 2/08 R). Eine **Leistungspflicht der Krankenversicherung für die Einleitung einer Insulinpumpentherapie liegt nicht vor**.

Indikation „Spritzenangst“ zur Insulinpumpe lt. Leitfaden MDK: eine spezielle Situation!

7. Kinder mit Nadelphobie

Bei einer Nadelphobie handelt es sich um ein definiertes (psychiatrisches) Krankheitsbild, das sich sowohl in der Symptomatik, als auch in der Therapie von einer Spritzen-Angst unterscheidet. Sowohl die Nadelphobie als auch die extreme nicht beherrschbare Spritzen-Angst sind äußerst selten. Nur wenn hierdurch die notwendige Einleitung der Insulintherapie mittels Pen akut nicht möglich ist, kann als **ultima ratio eine zunächst passagere Insulinpumpentherapie erforderlich sein**. Aufgrund der Schwere der Symptomatik erfolgt diese i.d.R. unter stationären Bedingungen.

Psychiatrische oder psychologische/psychotherapeutische Interventionen so wohl der Nadelphobie, als auch der nicht beherrschbaren Spritzenangst, **müssen bereits im Rahmen des primären stationären Aufenthalts im Sinne einer Akutintervention eingeleitet werden**, sowohl um eine komplikationsarme weitere Therapie zu ermöglichen, (u.a. auch wegen der notwendigen Blutzuckermessungen), als auch um eine Chronifizierung der psychiatrischen Zweiterkrankung zu vermeiden.

Bei ausgeprägter Spritzen-Angst kann ggf. eine Unterstützung durch die/den dem Diabetes- Team zugehörige/n Psychologin/ Psychologen erfolgen.

Innerhalb von 4 Wochen nach Einleitung der Insulinpumpentherapie aufgrund schwerer Angstzustände oder einer Phobie muss der Nachweis einer eingeleiteten psychiatrischen/psychotherapeutischen Behandlung inklusive Stellungnahme zur Persistenz des Zustandes unter eingeleiteter Therapie erbracht werden.

Eine sich erst im Verlauf einer intensivierten konventionellen Insulintherapie (ICT) entwickelnde Nadelphobie oder schwere Spritzenangst ist unwahrscheinlich. Eine medizinische Indikation zur speziellen Hilfsmittelversorgung ergibt sich aus der möglichen psychiatrischen Zweiterkrankung primär nicht. Vorrangig sollte eine psychiatrische

Indikationen zur Insulinpumpe lt. Leitfaden MDK

Fazit zur Indikationsstellung

Die **medizinische und sozialmedizinisch tragbare Indikation zur Versorgung mit einer Insulinpumpe ergibt sich in der Regel nicht aus einem einzelnen Kriterium, vielmehr aus dem dokumentierten Nachweis, dass das genannte Therapieziel (Vermeidung/Beherrschung eines oder mehrerer Symptome) auch nach Anpassung/Intensivierung der ICT nicht erreicht werden kann.**

In diesem Fall ist die Versorgung mit der Insulinpumpe im Sinne des § 12 SGB V zweckmäßig und wirtschaftlich; das Maß des Notwendigen wird nicht überschritten.

Dokumentation zur Insulinpumpe lt. Leitfaden MDK

Unerlässlich für die Therapieeinstellung bzw. Dosisanpassung ist eine aussagekräftige Dokumentation (8-12 Wo.) mit:

- mindestens 4 - 5 Blutzuckerwerten pro Tag (ggf. auch Nachtwerten) unter Angabe der aufgenommenen BE
- der verabreichten Boli
- der ggf. verabreichten Korrekturereinheiten/-BE
- des Basalinsulins
- möglichst Bemerkungen zur Erklärung besonderer Stoffwechselsituationen.

Blutzuckermessungen sind mindestens notwendig:

- vor den Mahlzeiten,
- zeitnah nach Ausgleich einer Hypoglykämie/Hyperglykämie,
- bei besonderen Fragestellungen (z.B. Blutzuckerverhalten in der Nacht, vor, während und nach intensiver oder ungewohnter körperlicher Aktivität (Sport etc.), bei akuten Krankheiten).

Die Blutzuckertagesprotokolle dienen der Beurteilung der Compliance und Motivation zur Stoffwechsellkontrolle und Dokumentation aller für die Stoffwechselführung notwendigen Parameter sowie dem Nachweis des sicheren und zielgerichteten Umgangs mit der Insulintherapie. Ausschließlich dokumentierte Blutzuckerwerte lassen diese komplexe Beurteilung nicht zu und sind nicht ausreichend für die Begutachtung!

Begutachtung zur Insulinpumpe lt. Leitfaden MDK

Können bei sogenannten Folgeversorgungen Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Maßnahme z.B. aufgrund von Motivations- / Adhärenzproblemen oder aufgrund gravierenden Fehlverhaltens des Anwenders (z.B. bei rezidivierenden Abszessen, offenkundigen Wissensdefiziten, absichtliche Über- oder Unterdosierung von Insulin im Rahmen von Essstörungen) im Einzelfall nicht mehr erkannt werden, kann eine erneute qualifizierte und strukturierte Schulungsmaßnahme, ggf. auch unter stationären Bedingungen, in einer entsprechend qualifizierten Einrichtung empfohlen werden bzw. ggf. von einer Weiterversorgung abgesehen werden).

Eine **Begutachtung mit persönlicher Befunderhebung** ist meist - besonders im Rahmen des Erstgutachtens - **nicht zielführend** und bringt in der Regel keine neuen wegweisenden medizinischen Fakten. Sie kann z.B. jedoch in Einzelfällen zur Klärung besonderer persönlicher Faktoren, die einen ausreichenden Versorgungserfolg behindern und zur Beratung der/des Versicherten bzw. deren/dessen Eltern hilfreich sein.

CGM, kontinuierlicher Glukose Messung, bei Kindern und Jugendlichen DPV-Daten, 2012, Prof. Holl

- Nutzung selten, ca. 6% haben einen Glukose-Sensor überhaupt einmal > 1 Tag genutzt
- davon haben nur ca 30% einen Sensor länger als 30 Tg. genutzt
- **zur Zeit können ein CGM-System / Sensoren nicht verordnet werden!**
 - Nur Einzelfall-Entscheidungen
- **dennoch nutzen bereits viele Teams CGM bei Kindern und Jugendlichen**

CGM, „Nikolaus-Beschluss“ des Bundesverfassungsgerichts

Da es sich bei einem kontinuierlichen Glukosemess-System, das auf einer Gewebszucker- und nicht auf einer Blutzuckermessung beruht, um eine in ihrer Gesamtstrategie **prinzipiell neue diagnostische Methode** handelt, hat der Gemeinsame Bundesausschuss den Nutzen und die medizinische Notwendigkeit zu bewerten. Ein Bewertungsverfahren wurde im Januar 2012 eingeleitet. Der Bewertungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Sollte ein Antrag auf Versorgung mit dem CGMS vorgelegt werden, kann die **Einzelfall-Begutachtung** für eine Versorgung daher derzeit **nur nach den Kriterien der Begutachtungsanleitung NUB** in Beachtung der **Kriterien des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 06.12.2005** (Az.: 1 BvR 347/98) erfolgen.

Leitsatz

zum Beschluss des Ersten Senats

Es ist mit den Grundrechten ... nicht vereinbar, einen gesetzlich Krankenversicherten, für dessen lebensbedrohliche oder regelmäßig tödliche Erkrankung eine allgemein anerkannte, medizinischem Standard entsprechende Behandlung nicht zur Verfügung steht, von der Leistung einer von ihm gewählten, ärztlich angewandten Behandlungsmethode auszuschließen, wenn eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf besteht.

CGM Bewertung durch GBA und IQWiG

 Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen

Kontinuierliche interstitielle Glukosemessung (CGM) mit Real-Time-Messgeräten bei insulinpflichtigem Diabetes mellitus

Vorläufiger Berichtsplan

Stellungnahmen und Teilnahme an Anhörungen zur CGM Bewertung durch GBA und IQWiG

Gemeinsame Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Diabetologie (AGPD) und der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und -diabetologie (DGKED) zum vorläufigen Berichtsplan des IQWiG zum Auftrag des G-BA zur Kontinuierlichen interstitiellen Glukosemessung (CGM) mit Real-time-Messgeräten bei insulinpflichtigem Diabetes mellitus (Auftrag D12-01)

Gemeinsame Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Diabetologische Technologie (AGDT) der Deutschen Diabetes-Gesellschaft (DDG) und diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe

zum vorläufigen Berichtsplan des IQWiG im Auftrag des G-BA zur „Kontinuierlichen interstitiellen Glukosemessung (CGM) mit Real-time-Messgeräten bei insulinpflichtigem Diabetes mellitus“ (Auftrag D12-01, Version 1.0, Stand 18.04.2013)

Kriterien für Studien zur CGM Bewertung durch das IQWiG

Tabelle 1: Übersicht über die Kriterien für den Studieneinschluss

Einschlusskriterien	
E1	Patienten mit insulinbehandeltem Diabetes mellitus (siehe auch Abschnitt 4.1.1)
E2	Beschreibung der Prüfintervention: kontinuierliche interstitielle Glukosemessung (CGM) mit Real-Time-Messgeräten (siehe auch Abschnitt 4.1.2)
E3	Beschreibung der Vergleichsintervention: andere Messverfahren sowie Varianten der rCGM ^a (siehe auch Abschnitt 4.1.2)
E4	patientenrelevante Endpunkte wie in Abschnitt 4.1.3 formuliert
E5	randomisierte kontrollierte Studien
E6	Vollpublikation verfügbar ^b
E7	Behandlungsdauer ≥ 24 Wochen (bei Cross-over-Studien je Periode)

a: Im vorliegenden Bericht wird ausschließlich die rCGM betrachtet, bei der die Glukosekonzentration im Interstitium des Unterhautfettgewebes gemessen wird.
 b: Als Vollpublikation gilt in diesem Zusammenhang auch ein Studienbericht gemäß ICH E3 [18] oder ein Bericht über die Studie, der den Kriterien des CONSORT-Statements [19] genügt und eine Bewertung der Studie ermöglicht, sofern die in diesen Dokumenten enthaltenen Informationen zur Studienmethodik und zu den Studienergebnissen nicht vertraulich sind.
 CGM: kontinuierliche Glukosemessung; CONSORT: Consolidated Standards of Reporting Trials; ICH: International Conference of Harmonization; rCGM: kontinuierliche Glukosemessung mit Real-Time-Messgeräten

Endpunkte bei Studien zur CGM Bewertung durch das IQWiG

4.1.3 Patientenrelevante Endpunkte

Für die Untersuchung werden folgende patientenrelevante Endpunkte betrachtet:

- Gesamtsterblichkeit
- kardiovaskuläre Mortalität (koronare, zerebrovaskuläre)
- kardiovaskuläre Morbidität (koronare, zerebrovaskuläre, periphere arterielle)
- Erblindung
- terminale Niereninsuffizienz (Notwendigkeit einer Dialysetherapie oder Nierentransplantation)
- Amputation (Minor- und Majoramputationen)
- ketoazidotisches bzw. hyperosmolares Koma
- gemeinsame Betrachtung des Auftretens von Hypoglykämien, insbesondere schwere Hypoglykämien, und des HbA1c-Wertes¹
- Symptomatik bedingt durch chronische Hyperglykämie
- sonstige unerwünschte Ereignisse
- gesundheitsbezogene Lebensqualität (einschließlich Aktivitäten des täglichen Lebens)

Für Kinder und Jugendliche werden zusätzlich folgende patientenrelevante Endpunkte verwendet:

- körperliche Entwicklungsstörungen
- psychosoziale Entwicklungsstörungen

Anmerkungen und Kritik zur projektspezifischen Methodik zur CGM Bewertung durch das IQWiG

- 1.1 Die Sensorunterstützte Insulinpumpentherapie (SUP) fehlt als getrennt und einzeln ausgewiesene Intervention im Prüfpfad
- 1.2 Fokussierung auf die Zielgrößen bzw. „Patientenrelevante Endpunkte“ erwachsener Menschen mit Typ-1-Diabetes und nicht auf kinderspezifische Parameter:
- 1.3 Fehlende Berücksichtigung von Daten, die die pädiatrische Versorgungsrealität abbilden:
- 1.4 Nur gemeinsame Betrachtung von Hypoglykämien (insbesondere schwerer Hypoglykämien) und des HbA1c-Wertes. Auch eine getrennte Betrachtung der einzelnen Parameter muss berücksichtigt werden.
- 1.5 Kriterien für den Studieneinschluss müssen Durchführbarkeit von Studien an Kindern besonders berücksichtigen

Standardisierter Antrag zur Kostenübernahme von CGMS

Standardisierter Antrag der Arbeitsgemeinschaft Diabetologische Technologie (AGDT) der DDG zur Kostenübernahme für ein System zum kontinuierlichen Glukosemonitoring (CGM-System) mit einem längerfristigen therapeutischen Einsatz zur Einzelfallentscheidung im Sinne einer Begutachtung einer Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode (NUB)

Podiumsdiskussion

Moderation K. Lange, Hannover

**Kinder mit Diabetes in Hort und Schule – welche Strategien
sind erfolgreich?**

10. Karl-Stolte-Seminar zur Pädiatrischen Diabetologie 10. Januar 2014

Podiumsdiskussion:

**Kinder mit Diabetes in Hort und Schule.
Welche Strategien sind erfolgreich?**

MHH MH Hannover Karin Lange

Kinder mit Diabetes in Hort und Schule.
Welche Strategien sind erfolgreich?

Diskutanten

Heike Sander, Landesgeschäftsführerin der Barmer GEK Niedersachsen, Bremen

Dr. Britta Schunter, Schulärztin Team Jugendmedizin und Sozialpädiatrie der Region Hannover

Oliver Bischoff, stellv. Schulleiter Astrid-Lindgren-Schule Ilsede, Förderschule für geistige Entwicklung

Sarah Bläsig, Diabetesberaterin DDG, KJKH auf der Bult Hannover

Vertreter der Kultusministerin Frau Frauke Heiligenstadt

MHH MH Hannover Karin Lange

Gute Vorsätze und politische Realität

Neujahrsansprache von Ministerpräsident Stephan Weil 2014

Wir müssen die großen Herausforderungen anpacken, vor denen wir stehen. Dazu gehört bei uns in Niedersachsen insbesondere der Einsatz für bessere Bildung.

Wir werden damit beginnen, flächendeckend gute Ganztagschulen aufzubauen und auf diese Weise viele Familien entlasten, aber auch vielen Kindern bessere Möglichkeiten anbieten, ihre Talente zu entfalten.

MHH MH Hannover Karin Lange

Gute Vorsätze und politische Realität

Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass das MK keinen Vertreter/ keine Vertreterin zu der von Ihnen veranstalteten Podiumsdiskussion entsenden kann.

Nach eingehender Prüfung sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass möglicherweise ein Ansprechpartner aus dem Sozialministerium für Sie besser geeignet wäre.

In der Praxis wird die Problematik von an Diabetes erkrankten Kindern in der Schule in enger Absprache mit dem Elternhaus und den Gesundheitsämtern geklärt.

Email vom 19.11.2013

Ministerin:
Frauke Heiligenstadt (SPD)

Susanne Schrammar
Niedersächsisches
Kultusministerium
Pressesprecherin

Kinder mit chronischer Krankheit in der Schule

Umso mehr freue ich mich Ihnen mitteilen zu können, dass die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) in Berlin nach umfassender Prüfung nun zu dem Ergebnis gekommen ist, dass eine zivilrechtliche Haftung einer Lehrkraft gegenüber Schülerinnen oder Schülern (bzw. ihren Sorgeberechtigten) grundsätzlich ausgeschlossen ist, wenn diese während des Schulbesuchs durch die Gabe notwendiger Medikamente durch eine Lehrkraft einen Gesundheitsschaden erleiden. Etwas anderes gilt nur, wenn die Lehrkraft die Schädigung der Schülerin oder des Schülers vorsätzlich herbeigeführt hat.

Situation von Kindern mit Diabetes in Schule/Hort

Herausforderungen

- ambitionierte Therapieziele und anspruchsvolle Therapie
- Inklusion
- Ganztagsunterricht / Hort / Schulmensa
- Familienersatz statt Ergänzung
- hohe Erwartungen an Erziehung und Betreuung
- hoher Anteil von Kindern mit besonderem Betreuungsbedarf

Fragen an die Diskutanten

Kinder mit Diabetes in Hort und Schule

Welche Strategien sind erfolgreich?
Ihre guten Erfahrungen?

Wo gibt es Handlungsbedarf?
Ungelöste Probleme?

MHH
Mittelhochschule
Merano

Karin Lange

Rechtliche Situation an Schulen

- Schulpflicht und Recht auf leistungsgerechte Förderung (Fürsorge- und Betreuungspflicht der Schule)
- Recht auf Teilnahme am Sport (**Niedersächsisches Schulgesetz in der Fassung vom 3. März 1998** (Nds.GVBl. S. 137), geändert [...] und Art.2 des Gesetzes v. 12.7.2007 (Nds.GVBl. Nr.22/2007 S.339) - VORIS 22410 01 -)
- Verpflichtung aller Lehrkräfte zur **Hilfe im Notfall** (Hypoglykämie) § 2 Abs. 1 Nr. 13 a SGB VII
- **Versicherungsschutz** § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII (gesetzliche Unfallversicherung DGUV) bei Medikamentengabe
- Literatur: <http://www.diabetes1kontakt.de>
Diabetesnetzwerk Saarland e. V.

MHH
Mittelhochschule
Merano

Karin Lange

Rechtliche Situation

Hilfe bei der regelmäßigen Therapie:

- Extracurriculare Aufgabe
- Personensorge von Eltern auf Lehrkraft übertragen
 - Verpflichtung der Lehrer/innen sich über die Krankheit eines Kindes zu informieren
 - Notfallmaßnahmen zu kennen und nach schriftlicher Absprache einzuleiten
 - Verpflichtung der Eltern, Lehrer zu informieren und zu kooperieren, bei Konflikten Unterstützung durch Schulärzte möglich
- „Ambulante Kinderkrankenpflege auch in der Schule möglich“
Träger: Krankenkassen auf ärztliche Verordnung
- „Persönliche Assistenz“ SGB XII § 53 (Eingliederungshilfe)
Träger: Bildungsbehörde auf Antrag

MHH
Mittelhochschule
Merano

Karin Lange

D. Arduini, Paris

**Extremsport mit Typ 1 Diabetes:
the Kilimanscharo – Experience**

**KARL STOLTE SEMINAR
HANNOVER
JANUARY, 11TH 2014**

Delphine ARDUINI
WORLD DIABETES TOUR
www.planete-insuline.com

WHO I AM ?

- ID**
 35 years old
 Type 1 Diabetes since Nov. 14th, 1994 (at 16y)
- My positive attitude**
 Live & enjoy each moment of my Life !
- My Keys to Freedom**
KNOWLEDGE - AUTONOMY - FREEDOM
- My resumé**
 Running Races & Ultra running races (> 20K)
 Treks (Patagonia, Nepal, Amazonia, Sahara...)
 Mountains hiking (Kilimanjaro - 5895m, Thorong Pass - 5416m, Mt Fuji - 3776m)
 Scuba Diving (PADI level 1)
 Travels + a 1 year around the world (16 countries - 2009/2010)
 Pregnancy and be a Mum !

... I am learning from each experience !

HIMAL - 14.5 km (Annapurna S)
Blue Island, CHELE WADI 2009
My most important challenge

WORLD DIABETES TOUR ASSOCIATION

- ID**
 Founded in 2008 in France
 Worldwide community of Type 1 & their family
 Website : www.planete-insuline.com
 FaceBook : WORLD DIABETES TOUR
- Our goals**
 Share a **POSITIVE ATTITUDE** towards Type 1 Diabetes

TALK about Type 1 Diabetes

FEDERATE ALL THE TYPE 1
We are always stronger together, and we learn from each other

WORLD DIABETES TOUR ACTIONS

- Website & Blog
 - Road book & feedbacks from my personal experiences with my Type 1 diabetes in my bag pack
 - Contact delphine@planete-insuline.com

WORLD DIABETES TOUR ACTIONS

- Website & Blog
 - Road book & feedbacks from my personal experiences with my Type 1 diabetes in my bag pack
- Conferences & Patients meetings
 - 2009 / 2010 : Thailand, Japan, China, French Polynesia, Chile
 - 2012 : 12 meetings in France

Nov 17th, 2012 - St Malo (France)
David (cyclist), Delphine, Timothée (sail)

Thailand 2009

Japan 2009

India 2009

China 2009

Type 1 through the ages - Nov 2012

WORLD DIABETES TOUR ACTIONS

- Website & Blog
 - Road book & feedbacks from my personal experiences with my Type 1 diabetes in my bag pack
- Conferences & Patients meetings
 - 2009 / 2010 : Thailand, Japan, China, French Polynesia, Chile
 - 2012 : 12 meetings in France
- Talks during scientific congress
 - SFD - France / EASD / ISPAD
 - Companies symposiums / Internal meetings

WORLD DIABETES TOUR ACTIONS

- Website & Blog
 - Road book & feedbacks from my personal experiences with my Type 1 diabetes in my bag pack
- Conferences & Patients meetings
 - 2009 / 2010 : Thailand, Japan, China, French Polynesia, Chile
 - 2012 : 12 meetings in France
- Talks during scientific congress
 - SFD - France / EASD / ISPAD
 - Companies symposiums / Internal meetings
- Special Events -> Opportunity to talk about Type 1 Diabetes
 - Sailing races « La Solidaire du Chocolat » - every 2 years
 - Medias / Interviews

Sail - Transat La Solidaire Du Chocolat 2012 (France / Mexico)

WORLD DIABETES TOUR ACTIONS

- Website & Blog
 - Road book & feedbacks from my personal experiences with my Type 1 diabetes in my bag pack
- Conferences & Patients meetings
 - 2009 / 2010 : Thailand, Japan, China, French Polynesia, Chile
 - 2012 : 12 meetings in France
- Testomonies during scientific congress
 - SFD - France / EASD / ISPAD
 - Companies symposiums / Internal meetings
- Special Events -> Opportunity to talk about Type 1 Diabetes
 - Sailing races « La Solidaire du Chocolat » - every 2 years
 - Medias / Interviews
- Sports challenges
 - Running races & ultra running races (>80k) *Diagonale des Fous - 166k, Sté Lyon - 69k*
 - Kilimanjaro 2013

THE KILIMANJARO *THE MOUNT*

- ID
 - ✓ Tanzania
 - ✓ The highest mountain in Africa (5895 m / 19341 ft)

- The ascension
 - ✓ When ? From August 30th to Sept. 5th 2013
 - ✓ How many days? 7 days
 - ✓ Which way ? MACHAME ROUTE
 - ✓ Accommodation? Tent & sleeping bag
 - ✓ Weather ? Sunny during the day.
Very cold during the night.....

KILIMANJARO 2013 *PROJECT*

Climb the Kilimanjaro with our travelling companion : our Diabetes

- Why ?
 - ✓ Sport challenge : 5895 m / 19341 ft to climb
 - ✓ To share a positive message towards Type 1 diabetes. Despite our diabetes, we can do it !
GO further, GO higher !

- ✓ To federate Type 1 from all around the world
- ✓ To talk in a positive way about diabetes

KILIMANJARO 2013 *PROJECT*

- Most challenging moments ?
Keep undercontrol our Diabetes despite the altitude effects on our blood sugar and the very cold conditions (-15°C) the last night

- Best memories ?
The Team, the Team spirit!

“True happiness
does not depend on any being,
any external object.
It only depends on us ...”

Dalai Lama

Meet us on FaceBook
▪WORLD DIABETES TOUR
▪FaceBook page : [T1Diabetes Kilimanjaro Expedition](#)

Contact me ...
Delphine ARDUINI
WORLD DIABETES TOUR *founder*
delphine@planete-insuline.com
www.planete-insuline.com

E. Sadeghian, A. Bokelmann, Hannover

**Trinken und Diabetes: Beratung zu Light-Getränken,
Obstsäften und Alkohol in der Pädiatrie**

Trinken und Diabetes:

Beratung zu Light-Getränken,
Obstsäften und Alkohol
in der Pädiatrie

Evelin Sadeghian & Anika Bokelmann
Diätassistentinnen VDD / Pädiatrie
Allgemeine Pädiatrie, Diabetologie,
Endokrinologie, Klinische Forschung
Adipositaschulung

Getränke...

- „Baby – Tee“
- „Baby – Saft“
- Fruchtsaft
- Fruchtsaftgetränke
- Fruchtschorle
- Limonade
- Eistee
- Sportgetränke
- aromatisiertes Wasser
- Energy – Drink
- Smoothies
- Kaffee/Frappuccino...
- Eiweißshakes
- Alkohol

Empfehlungen des Forschungsinstituts für Kinderernährung

geeignet:

- Mineralwasser
- Leitungswasser
- Früchte- und Kräutertee ungesüßt
- Malzkaffee
- Frucht- und Gemüsesäfte stark verdünnt

weniger geeignet:

- Fruchtsäfte pur
- Fruchtsaftgetränke und Nektare
- Limonaden
- Brause und süßstoffhaltige Getränke
- Frucht- und Gemüsesäfte stark verdünnt

nicht geeignet:

- schwarzer Tee
- Bohnenkaffee
- Cola – Getränke
- Energy – Drinks
- Eistee und alkoholische Getränke

Konsum zuckerhaltiger Getränke in Deutschland

Datenquelle: KIGGS ©Robert Koch-Institut

Richtwerte für die Aufnahme von Wasser durch Getränke pro Tag

Alter	Flüssigkeitsmenge in ml
1 bis unter 4 Jahre	820
4 bis unter 7 Jahre	940
7 bis unter 10 Jahre	970
10 bis unter 13 Jahre	1170
13 bis unter 15 Jahre	1330
15 bis unter 19 Jahre	1530

Datenquelle: D-A-CH-Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr

Baby - Tee

Zutaten: Maltodextrin, Fenchelextrakt
 Nährwert: 100 g enthalten 96 g Kohlenhydrate
 Standardauflösung: 100 ml Trinkwasser + 2 g Granulat
 (1,9 g Kohlenhydrate pro 100 ml)

100 % Direktsaft Reine Karotte

Zutaten: Karottensaft Vitamin C
 Nährwert: 100 ml enthalten 6 g Kohlenhydrate

Empfehlung: KEINE süßstoffgesüßten Getränke

Fruchtsaft – Obstsaft – Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat

Definition: Fruchtsaft ist ein gärfähiges, jedoch nicht gegorenes Erzeugnis aus Früchten einer oder mehrerer Fruchtarten. Farbe, Aroma und Geschmack sind charakteristisch für die Früchte. Fruchtsaft besteht zu 100 Prozent aus Saft.

- ohne Zuckerzusatz... (bis Ende 2016)
- selbstgepresst...>>> frisch gepresste Obstsaft sind wie die entsprechenden Obstsorten zu bewerten
- cirka 100 ml handelsübliche Obstsaft enthalten 10 g Kohlenhydrate

Empfehlung: 1 – 2 KE in Verbindung mit einer Mahlzeit
Trinkpäckchen max. (0,2 l) > zur Hypoglykämiebehandlung

Erfrischungsgetränke

- Limonade
- Brause
- Fruchtschorle
- Fruchtsaftgetränke

Definition: Erfrischungsgetränke enthalten im Allgemeinen Wasser in Form von Trinkwasser, natürlichem Mineralwasser, Quellwasser und/oder Tafelwasser sowie geschmackgebende Zutaten...

- Kohlensäure
- Mineralstoffe
- Vitamine
- Zuckerarten
- aus Früchten hergestellte, zuckerhaltige Konzentrate, ganz oder teilweise entsäuert, entbittert, entmineralisiert und/oder entfärbt,
- Aromen
- Zusatzstoffe
- gegebenenfalls weitere Zutaten

Erfrischungsgetränke - Beispiele

„Durstlöcher“ Tetrapack (0,5 l)
enthält ca. **6 KE**

Zutaten: Wasser, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, konzentrierter Sauerkirsch- und Zitronensaft, natürliches Aroma

Mehrfucht-Erfrischungsgetränk mit 10% Fruchtgehalt (0,33 l)
enthält ca. **3 KE**

Zutaten: Quellwasser, Mehrfruchtsaft 10%* (Orangensaft*, Apfelsaft*, Maracujasaft*, Kiwisaft*, Ananassaft*, Grapefruit-saft, Limettensaft*, Bananensaft*), Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12; Glukose-Fruktose-Sirup (*aus Fruchtsaftkonzentrat).

Empfehlung: Trinkpäckchen (0,2 l) enthalten ca. 1,5 bis 2 KE
> zur Hypoglykämiebehandlung

Erfrischungsgetränke mit Süßstoff gesüßt – light/zero/max

AUF DER BULT
KINDER- UND JUGEND-ERNAHRUNG

Erfrischungsgetränke, die ausschließlich mit Süßstoffen gesüßt werden, dürfen die Angabe „kalorienfrei“ tragen.

„**kalorienfrei**“ – das Produkt enthält nicht mehr als 4 Kcal (17 KJ) je 100 Milliliter.

„**energiefrei**“ – das Produkt enthält nicht mehr als 4 Kcal (17 KJ) je 100 Milliliter.

„**zuckerfrei**“ – das Produkt enthält nicht mehr als 0,5 g Zucker je 100 Milliliter.

ADI-Wert von Süßstoffen im Überblick (mg/kg Körpergewicht)

Süßstoff	Acesulfam K	Aspartam	Cyclamat	Neohesperidin DC	Saccharin	Sucralose	Thaumatococin
ADI-Werte	15	40	7	5	5	15	nicht festgelegt

ADI-Wert überschritten...

AUF DER BULT
KINDER- UND JUGEND-ERNAHRUNG

Für Aspartam wurde ein ADI-Wert in Höhe von **40 mg** pro Kilogramm Körpergewicht festgelegt.

Kind 10 bis unter 13 Jahre:

Gewicht ca. 38 kg x 40 mg >>> **1520 mg** Aspartam

1,5 Liter Getränk: 900 mg Aspartam

Kind 4 bis unter 7 Jahre:

Gewicht ca. 19 kg x 40 >>>**760 mg** Aspartam

1,5 Liter Getränk: 900 mg Aspartam

Empfehlung: energiefreie Erfrischungsgetränke in begrenzter Menge

Getränke eigener Art

- Sportgetränke
- Eistee - Getränke
- Near – Water – Getränk

AUF DER BULT
KINDER- UND JUGEND-ERNAHRUNG

Definition: kein besonderes Beurteilungsmerkmal:

„...dieser Marktsektor ist ausgesprochen innovativ und wächst schnell, so dass die Leitsätze mit der Entwicklung nicht Schritt halten können.“

Powerade Sports (0,5 l) enthält ca. **2,5 KE**

Pfanner Eistee (2,0 l) enthält ca. **14 KE**

Hella Mineralbrunnen Mineralwasser mit Geschmack (Erdbeer) (0,75 l) enthält ca. **3,5 KE**

Apollinaris Lemon enthält **keine** Kohlenhydrate

Empfehlung: Nährwertangaben beachten
ggf. kohlenhydratarme, -freie Variante bevorzugen

Getränke eigener Art

Energy - Drink

Zutaten: Wasser, Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure (E330), Kohlensäure, Taurin (0,4%), Glucoronolacton (0,23%), Aromen, Säureregulator Natriumcitrat (E331), Aroma Koffein (0,03%), Inosit, Vitaminmischung (Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B12) Guaranakernextract (Paulliana Cupana) (0,01%), Stabilisatoren (Gummi Arabicum E414, Glycerinester aus Wurzelharz E445), Ginsengwurzel-Extract (0,01%), Farbstoffe (Allura Red E129, Sunset Yellow E110).

Warnhinweis:

- „Erhöhter Koffeingehalt“ („Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen“)
- Farbstoffe E110/E129: Können Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen

Rockstar Energy Drink (0,5 l) enthält ca. 7 KE

Empfehlung: energiefreie Variante bevorzugen

Erzeugnis eigener Art

Smoothies

Definition: sind Produkte, die durch ihre flüssige Konsistenz den Fruchtsäften warenkundlich nahe stehen. Sie zählen jedoch nicht zu den Fruchtsäften. Im Vergleich zu den Säften enthalten sie deutlich weniger Wasser und daher mehr Nährstoffe.

Beispiel: „Mangorausich“

Zutaten: Mango, Mangonektar, Mangojoghurt

Empfehlung: www.mein-immergruen.de/wp-content/uploads/2012/10/Naehrwertliste_2012.pdf

Kaffee/Frappuccino/Chai Tea

bis zu 87.000 verschiedene Getränkekombinationen...

Zutaten???

Iced Shaken Hibiscus Tea

Caramel Frappuccino® blended beverage

Empfehlung: <http://globalassets.starbucks.com/assets/ba30025203244b04a971a9277b8b1d96.pdf>

Eiweißshake

Alkohol

Eiweißshakes

Sie heißen Champ Eiweiß plus, X-treme Supafit oder Multipower Muscle: Eiweißpräparate für den schnellen Erfolg. Sie sollen Muskeln sprießen lassen. Pulver und Drinks sind vor allem bei Jugendlichen beliebt.

Eiweißshakes

- „Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.“ (1-3 Portionen)
- „Kann eine ungünstige Wirkung auf die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern haben.“

Chinilingelb (E 104)

- keine cancerogene Wirkung von Chinilingelb gefunden
- bei disponierten Menschen – d. h. auf Lebensmittelzusatzstoffe im Allgemeinen empfindlich reagierende Personen– wird ein Zusammenhang bei der Auslösung von Pseudoallergien und hyperaktivem Verhalten vermutet

Eiweißbedarf

- Eiweißbedarf bei Jugendlichen (0,9g EW /kg KG) und Erwachsenen (0,8g EW/ kg KG)
- Hobbysportler (2-3x/Wo) benötigen 0,8g Ew/ kg KG
Leistungssportler 1,2g- 1,7g Ew/ kg KG
- Hersteller von Eiweißpräparaten rechnen häufig mit 2g Ew/ kg KG
- **Normale Ernährung deckt den Eiweißbedarf für *sportfaule und sportfreundliche* Menschen ausreichend!**
- **Mehr Eiweiß bringt nicht unbedingt mehr Muskeln!**

Biologische Wertigkeit

- ein Maß für die Effizienz des Nahrungsprotein zur Umsetzung in körpereigenes Protein
- Referenzwert ist Vollei, dessen biologische Wertigkeit auf 100 gesetzt wurde
- Je höher die biologische Wertigkeit eines Nahrungsproteins ist, desto niedriger ist die Bedarfsmenge an Eiweiß

Inhaltstoffe Eiweißshakes

	Biologische Wertigkeit
Molkeprotein	104
Eiprotein	100
Milchprotein	77
Soyaprotein	68-84

- Süßstoffe, Aromen

Biologische Wertigkeit normaler Lebensmittel

- Vollei und Kartoffel 137 %
- Milch und Weizenmehl 123 %
- Hühnerei und Soja 122 %
- Hühnerei und Milch 122 %
- Hühnerei und Weizen 118 %
- Rindfleisch und Kartoffeln 114%
- Milch und Weizen 105 %

- Bohnen und Mais 101 %

Biologische Wertigkeit normaler Lebensmittel

- mit zunehmender biologischer Wertigkeit sinkt die für das Eiweißgleichgewicht erforderliche Zufuhr
- z. B. bei 136 für 65 % Kartoffel mit 35 % Ei auf unter 0,4 g/kg

Mögliche Folgen von übermäßigem Eiweißkonsum

- Mundgeruch, Kopfschmerzen, Muskelkrämpfe und Übelkeit
- Erhöhte Cholesterinspiegel und Harnsäurespiegel
- 5g Protein mehr als der tägliche Bedarf lässt bei Erwachsenen das Risiko für Herz-Kreislauf- Erkrankungen um 5 % steigen

Proteindefinierte Ernährung

- 0,6-0,75 g Ew/ kg KG
- Nieren- Erkrankung Stadium 1 (GFR < 50ml/min, SKR<3 mg/%)
- Leber-Erkrankung Stadium 2 (Ovo- lacto- vegetabil)

Auswirkung auf den Blutzucker?

- Glukoplastischen Aminosäure
- Anpassung der Insulintherapie
- Ggf. FPE- Berechnung

Jugendschutzgesetz

Die Abgabe von branntweinhaltigen Produkten (Spirituosen, auch: branntweinhaltige Mischgetränke) an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist verboten. Auch deren Verzehr darf unter 18-Jährigen nicht erlaubt werden. Andere alkoholische Produkte (Bier, Wein, Sekt, auch: Mischgetränke) darf an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nicht abgegeben werden beziehungsweise deren Verzehr durch unter 16-Jährige nicht gestattet werden.

Für Tabak- und Alkoholprodukte besteht in Kinos ein Werbeverbot vor 18 Uhr

Daten aus KIGGS

- 19,6 % der 11-Jährige Jungen und 11,7 % 11-Jährige Mädchen haben schon einmal Alkohol getrunken.
- Bei den 13- Jährige 44,3 % Jungen und 48,1 % Mädchen
- 95 % der 17- Jährigen haben schon einmal Alkohol getrunken.
- Von den 11- 16 Jährigen trinken 38,5% der Jungen und 22,2% der Mädchen mind. 1 Woche Alkohol
- 67,2 % 17 Jährigen Jungen und 39,7 % der Mädchen trinken mind. 1 Woche Alkohol

Daten...

- Negative Korrelation zwischen Alkoholkonsum und Stoffwechsellage bei Patienten mit Diabetes: the Kaiser Permanente Northern California Diabetes Registry
J Gen Intern Med, 2008; 275-282
- Akute Komplikationen und Medikamenten-/ Drogen-missbrauch sind die Hauptursachen für gesteigerte Sterblichkeit bei Kindern und jungen Erwachsenen mit Typ-1 Diabetes: the Yorkshire Register
Diabetes Care 2008; 922-926

Alkoholabbau

- Alkohol wird vollständig über den Magen und Dünndarm aufgenommen
- Max. 10% wird unverändert über Lunge, Nieren und Haut ausgeschieden
- Der Alkohol-Abbau findet in der Leber und im Magen statt
- Kohlensäure erhöht die Magenschleimhautdurchblutung und somit auch die Alkoholaufnahme (z.B. Sekt)

Alkoholabbau

- Frauen haben bei gleicher Alkoholaufnahme höhere Blut-Alkoholspiegel (♂ 24 g; ♀ 12 g pro Tag)
- Alkohol ist ein hoher Energieträger (1 g = 7 kcal). Beim mäßigen Alkoholgenuss werden die zusätzlich aufgenommenen Nahrungsmittel als Fett gespeichert
- Bei vollen Zuckerspeichern unmittelbar nach der Nahrungsaufnahme kann der Alkoholkonsum blutzuckersteigernd wirken

Alkohol und Hypoglycämie

- Alkohol hemmt die Glukoneogenese
- Je höher der Alkoholgenuss, desto länger kann die Glukoneogenese gestört werden
- Das Risiko einer Unterzuckerung ist 10-20 Stunden nach Alkoholgenuss noch gegeben

Alkohol und Hypoglycämie

Turner BC et al., Diabetes Care, 2001

Alkohol und Hypoglycämie

- Die Magenentleerung wird durch Alkohol gehemmt
- Besonders gefährdet sind Personen mit reduzierten Zuckerspeicher (z.B. nach Hunger, Sport, bei bereits vorgeschädigter Leber, Zirrhose)
- Alkohol beeinträchtigt das Zentralnervensystem; gestörte Wahrnehmung einer Unterzuckerung

Alkohol und deren Risiko

- Übermäßiger, chronischer Alkoholkonsum kann zur Zunahme der proliferativen und exsudativen Augenhintergrundveränderungen, der peripheren Neuropathie (diabetisches Fußsyndrom, Impotenz) und der Adipositas führen

Was schulen wir?

- Zu und nach Alkoholgenuß kohlenhydrathaltige Nahrungsmittel essen!
 1 BE/KE pro Glas Wein / Bier / Sekt
- Der Kohlenhydratanteil sollte toleriert werden und nicht mit Insulin abgedeckt werden!
- Keine „light“ Softgetränke in den Cocktails mischen, v. a. wenn das Leben tobt ... Disco, Party etc.
- Häufige Blutzuckermessungen während des Alkoholkonsums aber auch am Tag danach!
 Ziel-BZ vor Schlafen gehen > 150 mg/dl

Was schulen wir?

- Informieren Sie Ihre Begleitpersonen, dass Sie Diabetes haben!
- Trinken Sie niemals so viel, dass Sie die Selbstkontrolle verlieren!
- Verzichten Sie auf Alkohol, wenn Sie Auto / Motorrad fahren müssen!

C. Ziegler, H. Saßmann, Hannover

Was kann man Kindern in der Diabetestherapie zumuten?

Dr. Claudia Ziegler (Diplom-Psychologin)
Diabetes-Zentrum für Kinder und Jugendliche
Hannover

Dr. Heike Saßmann (Diplom-Psychologin)
Medizinische Psychologie
Hannover

Was kann man Kindern in der Diabetestherapie zumuten?

Inhalte

- alterstypische Besonderheiten und kognitive Fähigkeiten im Kindergartenalter (3-6 Jahre)
- alterstypische Besonderheiten und kognitive Fähigkeiten im Grundschulalter (6-10 Jahre)
- Was bedeutet das konkret für die Umsetzung der Diabetestherapie?
- Wie kann ich das Kind unterstützen?

Kindergartenalter (3-6 Jahre) – alterstypische Besonderheiten

- zunehmende Körperbeherrschung
- sprachliche Differenzierung
- Suche nach Identität / Geschlechtsrolle
- Identifikation mit Eltern / Geschwistern
- prosoziales / gruppenbezogenes Verhalten
- soziale Ordnung über ideale Leitbilder
- „Trotzanfälle“
- unvorhersehbares Ess- und Bewegungsverhalten

Oerter & Montada (2002). Entwicklungspsychologie. Beltz: Weinheim.

Kindergartenalter (3-6 Jahre) – alterstypische Besonderheiten

diabetesspezifisch

- Stoffwechsellinstabilität
- hohe Insulinempfindlichkeit
- Anzeichen einer Unterzuckerung werden schwer wahrgenommen

Kindergartenalter (3-6 Jahre) - kognitive Fähigkeiten

- prä-operationale Stufe nach Piaget
- Egozentrismus
- Denken gebunden an aktuelle Wahrnehmung
- Zentrierung der Aufmerksamkeit
- finalistische Erklärungen, zufällige Ursache-Wirkungserklärungen
- magisches Denken
- Zeit als „beständiges Jetzt“

Jean Piaget (1896 – 1980)

Kindergartenalter (3-6 Jahre)

Was bedeutet das für die
Diabetestherapie?

Kindergartenalter (3-6 Jahre)

Wie kann ich das Kind unterstützen?

Grundschulalter (6-10 Jahre) - alterstypische Besonderheiten

- hohes Maß an motorischen Fähigkeiten
- erhöhte Selbstständigkeit
- Verständnis über sicht- und fühlbare Körperfunktionen
- kein differenziertes Organverständnis, isolierte Organfunktionen
- magische äußere Einflüsse; Strafe für Fehlverhalten oder Kontamination als Krankheitsursache
- „Kinder wollen Dinge tun“ und „benötigen externe Anerkennung“ (Erfahrung Selbstwirksamkeit)
- soziale Orientierung an Gleichaltrigen
- interne Verhaltenssteuerung (Gewissen)

Grundschulalter (6-10 Jahre) - kognitive Fähigkeiten

- konkret-operationale Stufe
- Denken gebunden an konkrete Objekte und Abläufe
- erste einfache logische Verknüpfungen (Konzept- und Regelbildung), Invarianz- und Erhaltungsprinzip
- komplexe abstrakte Zusammenhänge werden noch nicht verstanden
- Konzentration auf Gegenwart und nächste Zukunft
- keine langfristige Kosten-Nutzen-Abwägung

Grundschulalter (6-10 Jahre)

Was bedeutet das für die Diabetestherapie?

Grundschulalter (6-10 Jahre)

Wie kann ich das Kind unterstützen?

Weitere Hilfen

- Diabetesteam
- Schulung des Kindes
- regelmäßige Teilnahme von Eltern und Kindern an ambulanten Folgeschulungen
- Teilnahme an Diabetesfreizeiten
- Erziehungs- und Familienberatungsstellen (Jugendamt, kirchliche Träger)
- Hürter, von Schütz, Lange (2012). Kinder und Jugendliche mit Diabetes. Medizinischer und psychologischer Ratgeber für Eltern. Berlin: Springer.
- Diabetes Eltern-Journal, Verlag Kirchheim Mainz.

Zusammenfassung

- die Umsetzung der Diabetestherapie ist nur eine von vielen Entwicklungsaufgaben des Kindes
- altersentsprechende Beteiligung von Anfang an
- das Ausmaß der Beteiligung ist abhängig von den Fähigkeiten und Bedürfnissen des Kindes
- erreichbare Ziele gemeinsam erarbeiten
- den Fokus auf Erfolge legen
- bei Bedarf Unterstützung in Anspruch nehmen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

M. Fath, S. Bläsing, Hannover

Closed-loop: wie funktioniert das praktisch?

Closed-Loop, wie funktioniert das praktisch?
Karl-Stolte-Seminar 2014
The DIABETES WIRELESS AP CONSORTIUM
DREAM
Maryam Fath
Sarah Bläsig

Warum nächtlicher Closed-Loop ?

Um eine nächtliche Euglykämie zu erreichen

- Keine signifikante Verbesserung der Glukosekontrolle mit CSII oder CGM Einsatz ^{1,2}

Zur Verbesserung der Lebensqualität:

- Eltern berichten über nächtliche Hypoglykämie-Angst ^{3,4} auch mit Sensoreinsatz ⁵
- 90% der Eltern berichten über ein besseres nächtliches Sicherheitsgefühl, wenn sie ein Closed-loop-system einsetzen könnten⁶

¹ Deiss D et al, *Pediatr Diabetes*. 5(3):117-21, 2004

² Battelino T et al, *diabetes care*. 34(4): 795-800, 2011

³ Barnard K et al, *BMC Pediatr*; 15:10-50, 2010

⁴ Monaghan MC et al, *Fam Syst Health*; 27(1):28-38, 2009

⁵ Mauras N et al, *Diabetes Care*; 35(2):204-10, 2012

⁶ Elkeri D et al, *Diabetes Technol Ther*; 12(1):35-39,2010

Nächtliche Hypoglykämie:

- Die Mehrzahl der schweren Hypoglykämien ereignen sich in der Nacht ¹
 - 75% der hypoglykämischen Krampfanfälle bei Kindern ²
 - 6% der verstorbenen Patienten (T1DM Alter <40 Jahre) aufgrund vom "dead-in-bed" syndrom³
- Hypoglykämie ereignet sich in 8.5% der Nächte mit einem CGM ⁴
 - 71% der Jugendlichen reagierten nicht auf Sensoralarme in der Nacht ⁵
- Die Fähigkeit von einem CGM die Rate von schwerer Hypoglykämie zu reduzieren, ist signifikant abhängig von der Regelmäßigkeit des Sensorgebrauchs ⁶

¹ The DCCT. *NEJM*; 329(14):977-86,1993

² Davis et al, *Diabetes Care*; 20(1):22-6,1997

³ Sovik and Thordarson, *Diabetes Care*; 22(2):B40-2,1999

⁴ JDRF CGM Study group. *Diabetes Care*; 33:1004-8, 2010

⁵ Buckingham et al, *Diabetes Technol Ther*; 7:440-7,2005

⁶ Phillip M, *Pediatric Diabetes*; 13:215-228, 2012

Warum eine Hypoglykämie vermeiden?

- Rezidivierende oder schwere Hypoglykämien können:
 - zu Lernschwäche und Gedächtnisstörungen bei Kindern führen. (Northam EA, Diabetes Care 2011)
 - eine schwere Morbidität und Mortalität verursachen (Edge JA, Arch Dis Child 1999)
- Das Erlebniß einer Hypoglykämie kann die Angst vor einer Hypoglykämie steigern und eine gute Blutzuckereinstellung verhindern. (Haugstvedt A, Diabetes Med 2010)
- Schwere Hypoglykämie (**und auch die milde**) ist **DER** limitierende Faktor beim Erreichen einer optimalen Blutzuckereinstellung (2013)

Nächtliche Studien mit dem Artificial Pankreas

Hovorka R et al Lancet 27:378:743-51, 2010	17 Kinder & Jugendliche	3 Studien: 12 Stunden CL Vs CSII
Clarke WL et al J Diabetes Sci 7:3:1031-8, 2009	8 Erwachsene	12 Stunden CL Vs CSII
Nimri R et al Diabetes Tec Ther;14:728- 35,2012	7 Jugendliche & junge Erwachsene	12 Stunden CL
Elleri D et al Diabetes Tec Ther;13:419-24, 2011	8 Kinder	CL initiated at 18:00 or 21:00
Nimri R et al Pediatr Diabetes;14:159- 67,2013	12 Jugendliche & junge Erwachsene	12 hours CL Vs CSII
Dauber A et al Diabetes Care. 36:222-7,2013	10 Kinder	2 consecutive nights Vs CSII
O'Grady MJ et al Diabetes Care;35:2182-7,2012	8 Jugendliche und junge Erwachsene	2 consecutive nights Vs CSII
Kovatchev B et al J Dia Sci Tech;4:1374-81,2012	20 Erwachsene	14.5 hours CL Vs CSII

Artificial Pancreas Studien – 2013

Ambulant

Phillip M et al N Engl J Med 28;368:824-33 2013	56 Adolescents	Overnight CL Vs SAP
Cobelli C et al Diabetes Care;35:e65-7,2012	2 Adults	Case report of CL at hotel

Zu Hause

Nimri R et al ATTD 2013	15 Adolescents & Adults	Overnight CL Vs SAP
Hovorka R et al ATTD 2013	6 Adolescents	Overnight CL

DREAM

univerzitetni
klinični center ljubljana

Vorbereitung für den Closed-Loop

Blutzucker:
Mindestens 2
Kalibrationen am Tag

Close loop:
Pumpe wird automatisch
nach Insulin- und
Sensordaten gesteuert

Sensorenunterstützte
Therapie:
Nur Anzeige der
Werte

Der „Closed-Loop“ Algorithmus

- MD-Logic Artificial Pancreas (MDLAP):
 - Die Idee dieses Systems ist, dass die vom Computer berechneten Entscheidungen auf Faktoren beruhen, die auch ein Arzt zur Grundlage seiner Entscheidungsfindung macht, also nicht auf physiologischen Modellen oder Wahrscheinlichkeiten
 - Grundlage für die Entscheidung ist eine Vorausberechnung des BZ-Verlaufs aufgrund der bisherigen Daten

E. Atlas, R. Nimri, S. Miller, E.A. Gunberg, M. Phillip. MD-Logic Artificial Pancreas System. A pilot study in adults with type 1 diabetes. Diabetes Care 2010; 33: 1072-1076

Das Fuzzy Logic Kontrollsystem

Fuzzylogic Regel :

Wenn der Glucosewert **HOCH** ist, dann gebe **GROßEN** Insulinbolus

Das Fuzzy Logic Kontrollsystem

Regel 1: wenn der Glucosewert **NORMAL** ist, dann ist *Basal* **REGULÄR**

Glucose = 125 mg/dl (6.95mmol/l)

Regel 2: wenn der Trend **STEIGEND** ist, dann sollte *Basalinsulin* ETWAS ANSTEIGEN

Trend = 0.8 mg/dl/min

Erhöhe *Basal* um 20%

Was funktioniert mit Fuzzy-Logic ?

Beginn

- Benötigt werden folgende Werte zu Beginn des Closed Loop:
 - Basalrate
 - KE-Faktor
 - Senkungsregel
 - Daten aus ambulanter Therapie (BZ, KE, Insulin)
 - Sensordaten mindestens 4 Tage
 - es genügen je ein KE-Faktor und eine Senkungsregel, da ständige Anpassung erfolgt

E. Atlas, R. Nimri, S. Miller, E.A. Gunberg, M. Phillip. MD-Logic Artificial Pancreas System. A pilot study in adults with type 1 diabetes. Diabetes Care 2010; 33: 1072-1076

Einstellung

- Bevor der Patient mit dem System verbunden werden kann, erfolgt die Evaluation der Glucose-Insulin-Dynamik. Der Patient erhält einen Sensor und führt zu Haus für einige Tage seine reguläre Therapie durch.
- Danach werden die Daten vom Sensor, der Insulinpumpe und dem Tagebuch abgerufen und von dem automatisch lernenden Algorithmus des Systems wird ein individuelles Profil erstellt.

E. Atlas, R. Nimri, S. Miller, E.A. Gunberg, M. Phillip. MD-Logic Artificial Pancreas System. A pilot study in adults with type 1 diabetes. Diabetes Care 2010; 33: 1072-1076

Im Verlauf

- Automatische Anpassung der Basalrate an BZ-Verlauf nach Vorausberechnung (auch Pause)
- Automatische Bolusabgabe bei BZ-Anstieg
- Anpassung der Insulinfaktoren nach Analyse der bisherigen Ereignisse

E. Atlas, R. Nimri, S. Miller, E.A. Gunberg, M. Phillip. MD-Logic Artificial Pancreas System. A pilot study in adults with type 1 diabetes. Diabetes Care 2010; 33: 1072-1076

24-h-Closed-Loop

MD-logic artificial pancreas system: a pilot study in adults with type 1 diabetes. Atlas E, Nimri R, Miller S, Grunberg EA, Philip M. Diabetes Care. 2010 May;33(5):1072-6.

Überwachung

- Remote diabetes monitoring module (RDM) zeigt eine Echtzeit Aufnahme der Blutzuckerwerte
- Es basiert auf die ZONTM Control Software Packet vom Galooli Ltd.
- Alle Daten der Patienten werden zu einer Kontroll und Kommandozentrale geschickt .
- Die Sicherheitsmodule des MDRS allarmieren bei Hypoglykämie, anhaltender Hyperglykämie, Sensorfehler, Pumpenfehler und technischen Problemen.

Überwachung

DREAM Projekt Nächtlliche Closed-loop Glucosekontrolle

DREAM6: 24 Stunden Artificial Pankreas

DREAM5: MD-Logic Pump Advisor

DREAM4: Übernacht zu Hause

Kinder, Jugendliche & Erwachsene (N ~ 150)

DREAM3: Übernacht im Diabetes Camp

Kinder & Jugendliche (N=54)

DREAM2: Krankenhaus Übernacht

Kinder, Jugendliche & Erwachsene (N=15)

DREAM1: Machbarkeit

Jugendliche & Erwachsene (N=12)

Dream 2

- 5 Patienten im Krankenhaus
- 1 Nacht am Closed loop System
- 1 Nacht mit Sensor und Pumpe
- i.v. Zugang zur Sicherheit
- Gleiche Mahlzeit zum Abendbrot
- Überwachung via Internet, aber Team und Teilnehmer direkt auf der Station

Der erste Patient in Hannover

DREAM 2: Ergebnissen Krankenhaus Übernacht

12 Patienten mit Typ 1 DM nahmen an 24
Studiennächten teil (8 Jugendliche)

Niniri R et al The "Glucositer" overnight automated closed loop system for type 1 diabetes: a randomized crossover trial. *Pediatr Diabetes*. 2013 May;14(3):155-67

Dream 3

- Design: Multizentrische randomisierte, cross-over Studie mit 56 Jugendlichen
- Ziel: Die Beurteilung der Sicherheit und Effektivität des MD Logic Artificial Pancreas System in einer Camp Situation

Slovenia Israel Germany

Dream 3

Cross over design

- ## Primäre Endpunkte
-
- Anzahl der Hypoglykämien unter 63mg/dl (3.5mmol/l)¹
 - Zeit unter 60 mg/dl (3.3mmol/l)²
 - Mittlerer nächtlicher Glucosespiegel
 - ¹ nach der Europäischen Richtlinie für Hypoglykämie
 - ² FDA guidelines for artificial pancreas device systems

Ergebnisse: Studien - Teilnehmer

54 von 56 Patienten mit Typ 1 DM wurden ausgewertet

N=54	Mittelwert ± SD
Alter [Jahre]	13.8 ± 1.8
Geschlecht [W/M]	25/31
Diabetesdauer [Jahre]	7.0 ± 3.5
Pumpenerfahrung [Jahre]	4.8 ± 2.8
BMI [kg/m ²]	20.8 ± 2.9
Tagesgesamtdosis [E/kg]	0.8 ± 0.3
HbA1C [%]	8.0 ± 0.7

Phillip M, Battelino T, Atlas E, Kordonouri O, Bratina N, Miller S, Biester T, Stefania MA, Muller I, Nimri R, Danne T. Nocturnal Glucose Control with an Artificial Pancreas at a Diabetes Camp. N Engl J Med 2013;368:824-33

- ### Ergebnisse: Sicherheit
- Keine ernsten Nebenwirkungen
 - Keine Episoden mit schwerer Hypoglykämie
 - Keine Ketoazidosen
- Phillip M. Battelino T, Atlas E, Kordonouri O, Bratina N, Miller S, Biester T, Stefanija MA, Muller I, Nimri R, Danne T. Nocturnal Glucose Control with an Artificial Pancreas at a Diabetes Camp. N Engl J Med 2013;368:824-33.

DREAM 4 @ home

Randomisierte, prospektive, einseitig verblindete cross-over Studie bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

- Ziel ist die Sicherheit und die Effektivität der nächtlichen Blutzuckereinstellung durch das MD-Logic Artificial Pankreas bei Menschen mit einem Typ 1 Diabetes zu überprüfen
- MD-Logic AP vs. SuP
- Multinational, Multicenter
 - ✓ Slovenia – Ljubljana
 - ✓ Germany – Hannover
 - ✓ Israel – Petah-Tikva

22.-25. Oktober 2013
Die ersten 5 Patienten auf dem Weg nach Hause

- ### Primäre Endpunkte
- Prozentualer Anteil der Nacht mit mittlerer Glukose zwischen 90-140 mg/dl (5-7,8 mmol/l)
 - Zeit unter 70 mg/dl (3.9mmol/l)¹
- ¹ FDA guidelines for artificial pancreas device systems
- AUF DER BULT**
KINDER- UND JUGEND-KRANKENHAUS

- ### Wesentliche Sekundäre Endpunkte
- Zeit im Zielbereich: 70 bis 140mg/dl (3,9-7,8 mmol/l)
 - Zeit unter 70 mg/dl
 - Zeit über 140, 180 mg/dl
 - Anzahl der Unterzuckerungen unter 70 mg/dl
 - AUC (Fläche unter der Kurve) unter 70 mg/dl
 - AUC über 140, 180 mg/dl
 - Die totale nächtliche Insulindosis
- AUF DER BULT**
KINDER- UND JUGEND-KRANKENHAUS

Die Vorbereitungsphase I

- **Sensoranlage**
 - Tragen des Sensors
 - Welche Stelle hat den größten Tragekomfort
 - Alarmer ausschalten oder großzügig einstellen
 - Günstige Kalibrationszeitpunkte
- **Basalratenüberprüfung**
- **KE- Faktoren**
- **Korrekturfaktoren**
- **Dokumentation**
 - Bewegung
 - Mahlzeiten
 - Insulingaben
 - Hypoglycämien unter 70 mg/dl

Die Vorbereitungsphase II

- **Internetverbindung vorhanden (auch im Schlafzimmer)**
- **Backup Internet vorhanden**
- **Teilnehmer können Verbindung zwischen PC und Pumpe aufnehmen**
- **Telefonnummer des Teilnehmers**
- **Weitere Nummern von Extrapersonen (mind. 2 weitere)**
- **Keine Loop Nacht allein!**

Die Closed Loop Nächte

- **Pumpe, Meßgerät und PC haben die gleiche Uhrzeit**
- **PC Töne sind an**
- **Sensor läuft**
- **Übereinstimmung Sensor – Blutzucker**
- **Internetverbindung steht**
- **Anruf an jedem Abend und Morgen und ggf. bei Alarmen**

Limitierung des Systems

- Internetverbindung wird unterbrochen
- Teilnehmer hört Alarme nicht
- Sensorprobleme
- Katheterproblem
- Kalibrationsfehler
- Viele Geräte = viele Problemmöglichkeiten

DREAM4 Pilot: Beispiel eines Overnight Closed-Loop zu Hause

Ergebnisse: coming soon.....

COPYRIGHT: MORTEN NOORMAN

K. Remus, K. Semler, A. Nieswandt, K. Schnell, Hannover

Soziale Medien und Diabetes:

**Wegweiser durch Computerprogramme und Apps für Kinder
und Jugendliche mit Diabetes**

Soziale Medien und Apps für Kinder und Jugendliche mit Diabetes

Dr. Kerstin Schnell, Anne Nieswandt, Kerstin Semler, Kerstin Remus

Internet

- Google
- Webseiten
- Foren
- Blogs
- Facebook
- Mobile Apps
- Twitter

Google

The screenshot shows a Google search for "kinder diabetes". The search results include several links to websites and forums related to children's diabetes. The results are as follows:

- Diabetes bei Kindern**: www.weltweit.de/bücherstopp - eine der 100 bewährtesten Buchklassiker und Buch-Rezensionen. 4000 von unabhängigen Lesern bewertet!
- Alles rund um Diabetes**: www.diabetes.de/organisationsdiabetesatag - Shows, Vorläge, Talkrunden in Berlin, Gießen, etc.
- Diabetes-Zentrale e.V.**: www.diabetes.de/zentrale - Der Verein für Diabetes im Internet. Erhalten Sie mehr über uns!
- Mit Diabetes beim Arzt**: www.wissenschaft.de/beraterbuch - So bereiten Sie sich optimal auf Ihren nächsten Arztbesuch vor.
- Diabetes-Kids.de**: www.diabetes-kids.de - Diabetes-Kids ist die größte virtuelle deutschsprachige Selbsthilfegruppe für Kinder und Jugendliche mit Diabetes Mellitus und deren Eltern. Forum, News auf Diabetes-Kids.de - BE Tabelle online - Forschung. Sie haben diese Seite am 18.11.13 besucht.
- Diabetes Top 1 bei Kindern**: Großes Drama im kleinen Körper - Show www.stern.de/diabetes - diabetes-app-1-bei-kindern-großes-drama-im-k - Kinder mit Diabetes vom Typ 1 müssen ihr Leben lang Insulin spritzen. Deutsch.

Diabetes-Webseiten und Diabetes Foren

www. diabetes-kids.de

Herzlich willkommen bei Diabetes-Kids.de

Die private Initiative Diabetes-Kids ist ein unabhängiges Forum und die größte virtuelle deutschsprachige Selbsthilfegruppe für Kinder und Jugendliche mit Diabetes Mellitus und deren Eltern mit kaum einem Klick.

Einer für Alle und Alle für Einen!

Unser Ziel ist es, einen Ort zu sein, den **Zusammenhalt** und **Wohlbefinden** zwischen Kindern und Jugendlichen mit Diabetes sowie deren Eltern zu fördern.

Du hast viele Informationen zum Thema Kind und Diabetes die hier nachgefragt!
 Ein wichtiger Tipp: eine Initiative, einen Link oder einen Anbieter?
 Dann frag sie doch alle zum Wohl der Gemeinschaft nach ein!

Wichtige Punkte zum Thema Typ 1 Diabetes:

- Die meisten Kinder mit Diabetes haben einen Typ 1 Diabetes!
- Typ 1 Diabetes wird im Kindesalter oder Adoleszenzalter vor dem Typ 2 Diabetes!
- Typ 1 Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung und hat nichts mit der Lebensführung oder dem Gewicht zu tun.
- Typ 1 Diabetes ist chronisch und bedarf eine gute sowie rasche Versorgung, auch nach und einer Ernährungsempfehlung!
- Typ 1 Diabetes ist und auch ihre Eltern können nichts für diese Krankheit!
- Typ 1 Diabetes brauchen Insulin. Eine Behandlung mit Insulin ist nicht möglich.
- Typ 1 Diabetes ist ein lebenslanges Ziel, das gut mit einem Typ 2 Diabetes.
- Typ 1 Diabetes können ein vollkommen normales und gesundes Leben führen, wenn die nötigen Regeln befolgt. Die können alles wissen und müssen keine "Diät" halten!

www.T1DStars.com

ES IN DER SCHULE ANSPRECHEN

Du verbringst viel Zeit an der Schule, deshalb ist es wichtig, auf Diabetes aufmerksam zu werden! Du bist ein Mensch, der in der Schule zuhause ist, deswegen der Diabetes-Abgrenzung nicht, ist es für dich einfacher und leichter, wenn Lehrer, die anderen Kinder und Eltern mit Diabetes wissen, dass Du Diabetes hast, damit sie verstehen, was Du Deine Blutzuckerwerte überprüfst, Insulin spritzt, Insulin nehmen oder etwas anderes in Zusammenhang mit Diabetes tun musst.

Hier sind ein paar Tipps, wie Du in der Schule auf Dich aufpassen kannst.

DARÜBER REDEN

Das ist wichtig, denn Diabetes ist eine Krankheit, die nicht geheilt werden kann. Du musst sie jeden Tag managen. Du musst Insulin spritzen und deinen Blutzucker messen. Du musst wissen, was Diabetes ist und warum du es hast. Wenn du es nicht sagst, werden die Leute denken, dass du krank bist. Du musst ihnen sagen, dass du Diabetes hast und warum du es hast. Du musst ihnen sagen, dass du es nicht alleine machen kannst. Du musst ihnen sagen, dass du Hilfe brauchst. Du musst ihnen sagen, dass du dich um Hilfe kümmern wirst. Du musst ihnen sagen, dass du dich um dich selbst kümmern wirst. Du musst ihnen sagen, dass du dich um dich selbst kümmern wirst. Du musst ihnen sagen, dass du dich um dich selbst kümmern wirst.

HERUNTERLADEN

Herunterladen Sie die Broschüre hier.

Selbsthilfegruppen

Webseiten

- Diabetes DE
- DDG, DDB Diabetes Organisationen
- Hersteller von Insulinpumpen, BZ-Geräten, Insulinen etc.
- Online Versandhandel (Mediq direct, Dia Expert)

Deutsche Diabetes Online Community

#DEDOC
 3,690,112
 14,270
 479

TweetChat
 Der #dedoc TweetChat ist ein virtueller Stammtisch für junge Menschen mit Diabetes. Wir treffen uns jeden Mittwoch um 21 Uhr unter dem Twitter-Hashtag #dedoc oder auf www.dedoc.de.

Ein Thema. Eine Stunde. Viele Stimmen.

#bzbingo
 Mitmachen, Spaß haben und ganz nebenbei Deinen Blutzucker verbessern! Jeden Mittwoch um 22 Uhr auf #dedoc. Dein Wert. Dein Ziel. Dein Sieg.

OpenBlog
 Das #dedoc OpenBlog ist ein Blog von und für Menschen mit Diabetes - zu allem, was uns rund um unseren Diabetes bewegt. Mach mit und sag uns Deine Meinung - auf www.dedoc.de/openblog. Hier kannst Du schreiben. Hier wirst Du gelesen.

#DEDOC

QR codes for #dedoc, #bzbingo, and openblog.

Social media icons for Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram.

Apps - Diabetesmanagement

iOS / App Store & Android / Play Store

mySugr Diabetes Companion

mySugr Junior

DiabetesConnect

SiDiary

Bildquelle: www.play.google.com, www.iphone-news.org

mySugr Companion

1. Registrieren und Profil anlegen

Bildquelle: aus App „mySugr Companion“

mySugr Companion

2. aktuelle Daten eingeben und speichern

Bildquelle: aus App „mySugr Companion“

mySugr Companion

3. Einträge ansehen, analysieren, bearbeiten und weiterleiten

Bildquelle: aus App „mySugr Companion“

mySugr Companion

4. Upgrade auf Pro-Version

Bildquelle: aus App „mySugr Companion“

mySugr Junior

1. Registrieren und Profil anlegen

Bildquelle: aus App „mySugr Junior“

mySugr Junior

2. aktuelle Daten eingeben und speichern

Bildquelle: aus App „mySugr Junior“

mySugr Junior

2. aktuelle Daten eingeben und speichern

Bildquelle: aus App „mySugr Junior“

mySugr Junior

3. Eltern empfangen Daten und können darauf antworten

Bildquelle: aus App „mySugr Junior“

DiabetesConnect

1. Registrieren und Profil anlegen

Bildquelle: aus App „DiabetesConnect“

DiabetesConnect

2. aktuelle Daten eingeben, speichern und ansehen

Bildquelle: aus App „DiabetesConnect“

DiabetesConnect

3. Einträge analysieren, bearbeiten und weiterleiten

Bildquelle: aus App „DiabetesConnect“

my life mylife SiDiary

1. Einstellungen und Profil bearbeiten

Bildquelle: aus App „mylife SiDiary“

my life mylife SiDiary

2. aktuelle Daten eingeben, speichern und ansehen

Bildquelle: aus App „mylife SiDiary“

my life mylife SiDiary

3. Einträge bearbeiten, analysieren und weiterleiten

Bildquelle: aus App „mylife SiDiary“

Stichwort: Neue Medien

Informations- und Kommunikationstechnik	1998	2003	2008	2013
Hochgerechnete Haushalte (1 000)	36 703	37 931	39 077	40 032
Anteil der Haushalte in % (Ausstattungsgrad)				
Personalcomputer (PC)	38,7	51,4	75,4	85,2
PC stationär	38,7	51,4	62,1	53,3
PC mobil (Laptop, Netbook)	-	-	34,7	65,2
PC Drucker (auch im Kombi)	-	-	-	73,3
Internetanschluss (auch mobil)	-	46,0	64,4	80,2
Telefon	-	98,7	99,0	99,8
Festnetztelefon	96,8	94,5	89,7	90,5
Mobiltelefon (Handy, Smartphone)	11,2	72,5	86,3	92,7
Faxgerät stationär (auch im Kombigerät)	14,8	20,7	20,7	23,8

2013 gab es 171,8 Handys oder Smartphones je 100 Haushalte!

www.destatis.de

Neue Möglichkeiten – Neue Gefahren nicht nur für Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus

Bildnachweis: Gary Hayes auf flickr.com.
 gefunden auf: <http://www.netzpiloten.de/social-media-definitionversuche/>

totaler Augenschluss vor den sog. Neuen Medien ist sicherlich nicht die Lösung, sondern das Lernen eines....

.....sinnvollen Umgangs mit den Medien

BZgA
Gut hinsehen und zuhören! - Ratgeber für Eltern

© IS2/photocase.com, gefunden auf: www.zeit.de

Umgang mit Medien - Empfehlungen der BZgA

Empfehlungen für Mediennutzungszeiten bei den 0- bis 2-Jährigen

Wenn überhaupt, sollten Babys und Kleinkinder so wenig wie möglich fernsehen. Das tägliche Fernsehen sollte maximal 20 Minuten nicht überschreiten. Hörmedien (Musikkassetten, -CDs, altersgerechte Hör-Erzählungen und -stücke) sollten maximal 30 Minuten am Tag genutzt werden.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2009: Gut hinsehen und zuhören! - Ratgeber für Eltern. Tipps und Informationen für Eltern zum Thema „Mediennutzung in der Familie“. Bestellnummer: 20281000

Umgang mit Medien - Empfehlungen der BZgA

Empfehlungen für Mediennutzungszeiten bei den 3- bis 5-Jährigen

Kinder dieser Altersgruppe sollten **täglich nicht länger als 30 Minuten** fernsehen oder am Computer aktiv sein. Auch die Nutzung von Handspielgeräten (wie zum Beispiel der Game Boy) und Konsolen ist in diesem Zeitbudget inbegriffen. Hörmedien sollten maximal 45 Minuten genutzt werden.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2009: Gut hinsehen und zuhören! - Ratgeber für Eltern. Tipps und Informationen für Eltern zum Thema „Mediennutzung in der Familie“. Bestellnummer: 20281000

Umgang mit Medien - Empfehlungen der BZgA

Empfehlungen für Mediennutzungszeiten bei den 6- bis 10-Jährigen

Kinder dieser Altersgruppe **sollten täglich maximal 45 Minuten** fernsehen oder am Computer aktiv sein. Auch die Nutzung von Handspielgeräten (wie der Game Boy) und Konsolen sind in diesem Zeitbudget inbegriffen. Hörmedien sollten maximal 60 Minuten genutzt werden.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2009: Gut hinsehen und zuhören! - Ratgeber für Eltern. Tipps und Informationen für Eltern zum Thema „Mediennutzung in der Familie“. Bestellnummer: 20281000

Umgang mit Medien - Empfehlungen der BZgA

Empfehlungen für Mediennutzungszeiten bei den 11- bis 13-Jährigen

Maximal 60 Minuten intensives Fernsehen oder Computern (inklusive Handspielgeräte) sind als täglicher Richtwert angemessen. Manche Kinder dieses Alters nutzen den Computer eher nebenbei für Musik **oder gelegentliches Chatten** mit Freunden und Freundinnen, während sie gleichzeitig spielen oder nebenher Aufgaben erledigen. Sind sie dabei in der Lage, sich bewusst auf Wesentliches zu konzentrieren und ihre Aufgaben einwandfrei zu erledigen, ist es noch annehmbar, wenn das Gerät bis zu 90 Minuten läuft. Achten Sie auch bei Kindern dieses Alters auf viel medienfreie Zeit und Alternativen zum Medienkonsum. Verabreden Sie bei Problemen Regeln, wann und wie lange der Computer oder Fernseher angeschaltet sein darf.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2009: Gut hinsehen und zuhören! - Ratgeber für Eltern. Tipps und Informationen für Eltern zum Thema „Mediennutzung in der Familie“. Bestellnummer: 20281000

Umgang mit Medien - Empfehlungen der BZgA

Die meisten Kinder besitzen mittlerweile eigene Handys.

vermittelt den meisten Eltern ein Gefühl der Sicherheit, weil sie ihre Kinder überall und jederzeit erreichen können. Doch die ständige Erreichbarkeit kann sich auch als Bumerang erweisen, weil sie sowohl Kinder als auch Eltern ziemlich „nerven“ kann.

Das Handy ist heute eine Art Minicomputer für kreativen, kommunikativen, aber auch mitunter teuren Zeitvertreib von Kindern.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2009: Gut hinsehen und zuhören! - Ratgeber für Eltern. Tipps und Informationen für Eltern zum Thema „Mediennutzung in der Familie“. Bestellnummer: 20281000

Sicher Surfen - Empfehlungen des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

- sicher-online-gehen.de** – Infos zu technischen Schutzlösungen
- surfen-ohne-risiko.net** – technische Hilfen, inter-aktive Spiele
- schau-hin.info** – Hilfen zur Medienerziehung
- chatten-ohne-risiko.net** – Sicherheitstests und Bewertung von Sozialen Netzwerken, Chat-Atlas
- klicksafe.de** – Aktuelles zu Sicherheit und Entwicklungen im Internet
- internet-abc.de** – Ratgeber und Lernplattform über das Internet
- kinderserver-info.de** – Installieren Sie den KinderServer

www.bmfsfj.de

Konkrete Anwendung in der Kinder- und Jugenddiabetologie??

rechtliche und organisatorische Probleme

- großer Markt
- keine einheitliche Kontrolle
 - Sept 2013: *Mobile Medical Applications - Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff*
 - TÜV Rheinland: www.checkyourapp.de
- wenig bis keine Studiendaten insbes. zu einzelnen Produkten
- Kosten?
 - bei der Abrechnung telemedizinischer Anwendungen befindet man sich in einer rechtlichen Grauzone. (Noch) keine EBM-Ziffern vorhanden.

Studien...

Studie	Jahr	Journal	N	Studiendesign	Charakteristika	Telemedizin	Ergebnisse
Marcolino MS et al: Telemedicine Application in the Care of Diabetes Patients: Systematic Review and Meta-Analysis	Nov 13	PLoS one	4207	Review: Randomisiert Kontrolliert	DM Typ 1 und 2, Erwachsene	Übertragung von Diatesmonitoring, Videokonferenzen, Schulungs-Webseiten, Schulungserinnerungen, Mail-Kontakte, Telefonanrufe, SMS-Service, Forumdiskussionen	HBA1c-Reduktion -0,44 %
Bell AM et al: Mobile Phone-Based Video Messages for Diabetes Self-Care Support	Mrz 12	Journal of Diabetes Science and Technology	65	Randomisierte Kontrolliert Prospektiv	DM Typ 1 und 2, Erwachsene	tägliche Videosnachrichten aufs Handy	HBA1c -1,2% (Kontrolle -1,0%)
Baron J et al: The Impact of Mobile Monitoring Technologies on Glycosylated Hemoglobin in Diabetes: A Systematic Review	Sep 12	Journal of Diabetes Science and Technology	507	Review (7 Studien)	DM Typ 1 (und 2), Erwachsene	Übertragung von BZ-Werten via mobiles Gerät auf einen online Server	"Benefit" (4 von 7 Studien)
Gudjuv R et al: Impact of Telemedicine in Managing Type 1 Diabetes Among School-age Children and Adolescents: An Integrative Review	Okt 13	Journal of Pediatric Nursing	278	Review (8 Studien)	DM Typ 1, 9-20 Jahre	Übertragung von BZ-Werten via mobiles Gerät an Klinik, automatisches Teletachistruhen-System, Computer-geführtes Schulungssystem	bessere glykämische Kontrolle (6 von 8 Studien); höhere Zufriedenheit (2 von 3 Studien)

Journal of Diabetes Science and Technology
Volume 4, Issue 4, July 2010
© Diabetes Technology Society

ORIGINAL ARTICLES

An Analysis of Data Management Tools for Diabetes Self-Management: Can Smart Phone Technology Keep Up?

Elizabeth Ciemins, Ph.D., MPH, MA,¹ Patricia Coon, MD,¹ and Christopher Sorli, MD,²

Diamedic Diabetes Logbook (5,49 €),

Blood Sugar Diabetes Control (0,89 €),

WaveSense Diabetes Manager (gratis, nicht im deutschen Store)

- Alle erfordern manuelle Dateneinträge
- keiner konvertiert Insulin-Kohlenhydrat-Ratios in Insulin-Dosis

Ciemins E et al. J Diabetes Sci Technol. 2010 Jul 1;4(4):958-60.

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit

K. Lange, W. von Schütz, Hannover

**Die neuen und überarbeiteten pädiatrischen
Schulungsprogramme**

10. Karl-Stolte-Seminar zur Pädiatrischen Diabetologie 11. Januar 2014

Neue und überarbeitete Diabetes-Schulungsprogramme in der Pädiatrie

MHH Medizinische Hochschule Hannover Prof. Dr. Karin Lange & Dr. med. Wolfgang von Schütz

Vorbereitung auf eine lebenslange Therapie

MHH Medizinische Hochschule Hannover Karin Lange / Wolfgang von Schütz

Grundlagen: NVL Leitlinien

- Überarbeitung der Version 1.0 und Integration pädiatrischer Aspekte
- Publikation 2013
- www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de

MHH Medizinische Hochschule Hannover Karin Lange / Wolfgang von Schütz

Grundlagen: S2 Leitlinie Psychosoziales und Diabetes mellitus

- S2 Leitlinie: Psychosoziales und Diabetes mellitus (2013)
- www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de
- Englische Übersetzung in Arbeit
- Erweiterung S3 mit ÄZQ geplant

Leitlinien (national)

Ziel	Strukturierte Schulungsprogramme sollen jedem Menschen mit Diabetes mellitus sowie gegebenenfalls wichtigen Bezugspersonen (z. B. Angehörigen) unmittelbar nach Diagnosestellung des Diabetes und regelmäßig im Verlauf der Erkrankung als unverzichtbarer Bestandteil der Diabetesbehandlung angeboten werden.	↑↑
Schulungsformen und -settings		
3-1	Die Durchführung der Basisschulung von Menschen mit Diabetes sollte entsprechend dem Diabetestyp, der Therapieform und dem Gesamtrisiko (z. B. Alter, Folge- oder Begleiterkrankungen) differenziert erfolgen.	↑
3-2	Wiederholungs-, Refresher- bzw. Ergänzungsschulungsmaßnahmen sollen entsprechend denen im Folgenden genannten Kriterien problem- und zielgruppenspezifisch als Gruppen- oder ggf. Einzelschulung angeboten werden.	↑↑
Empfehlungen-Statements		Empfehlungsgrad
4-4	Neben der Vermittlung von Wissen sollen in der Schulung auch affektive und verhaltensorientierte Aspekte integriert werden.	↑↑
4-5	Zur didaktischen Unterstützung sollen spezifische Schulungsmaterialien wie z. B. Patientenhandbücher oder Arbeitsblätter verbindlicher Bestandteil von strukturierten Schulungsprogrammen sein.	↑↑

Grundlagen: Pädiatrische S3-Leitlinie

- Praxisleitlinie: Typ 1 Diabetes Pädiatrie (2013)
- geplant: S3-Leitlinie Typ 1 Diabetes Pädiatrie (2014) ÄZQ
- geplant: Neuauflage der ISPAD Guidelines Education (2014)

Diabetesbuch für Kinder 4. aktualisierte Auflage

- (2013) Verlag Kirchheim; 19,95 €
- AGPD als Herausgeber
- aktualisierte Inhalte
- 6 Kapitel, 195 Seiten
- kindgemäße Didaktik
- neue zeitgemäße Zeichnungen (Steffi Krohmann)
- Spiralbindung
- Elternbroschüre
- www.verlag-kirchheim.de
- detailliertes Curriculum (Pabst Verlag, Lengerich (2013)) als Teil des ModuS-Projekts

MHH
Mittelschule
Paderborn

Karin Lange / Wolfgang von Schütz

Diabetes-Buch für Kinder 4. Auflage

Wie ich mich gut mit Insulin behandle

MHH
Mittelschule
Paderborn

Karin Lange / Wolfgang von Schütz

Diabetes-Buch für Kinder 4. Auflage

Wie viel Insulin brauche ich?

Für Kinder, die sich schon gut mit Diabetes auskennen.

- _____ Magen
- _____ Speiseröhre
- _____ Dünndarm
- _____ Bauchspeicheldrüse
- _____ Herz
- _____ Lunge
- _____ Dickdarm
- _____ Leber

MHH
Mittelschule
Paderborn

Karin Lange / Wolfgang von Schütz

Diabetes-Buch für Kinder 4. Auflage

Wie viel Insulin brauche ich?

Für Kinder, die sich schon gut mit Diabetes auskennen.

● morgens mittags abends sehr spät abends
 Einheiten schnelles (Analog) Insulin

MHH Mittelschule Hochschule
 Karin Lange / Wolfgang von Schütz

Diabetes-Buch für Kinder 4. Auflage

Den Schock der Diagnose „Diabetes“ überwinden
Die ersten Tage in der Kinderklinik

Wie Sie Ihrem Kind den Diabetes erklären können
Die ersten Tage in der Kinderklinik

Den Diabetes und seine Behandlung kennen lernen
Die ersten Tage in der Kinderklinik

integriert ins Kinderprogramm (46 Seiten)

Seminare 2014: 14/15.2.2014 München
Martina.Tillmann@kvb.de
 Internet : www.kvb.de

MHH Mittelschule Hochschule
 Karin Lange / Wolfgang von Schütz

Unterrichtsgestaltung

Flexibilität sollte Standard sein!

- keine Vorträge, sondern Anregungen zu selbst gesteuertem Lernen
- gemeinsames Erarbeiten theoretischer Inhalte im Gespräch, orientiert an individuellen Erfahrungen
 - Fehlersuche, Erfahrungsaustausch
 - konkrete Vorgaben statt abstrakter Regeln
- Lernen am Modell
- Unterstützung zur selbstbewussten Umsetzung des Gelernten
- Motivation über Selbstständigkeit, Selbstwertgefühl und Neugier (Selbermachen)
- Optimistische Ausstrahlung und Vertrauen aussprechen

MHH Mittelschule Hochschule
 Karin Lange / Wolfgang von Schütz

Diabetesschulung für Jugendliche (DMP Typ 1 Diabetes Pädiatrie)

The image shows five educational materials for adolescent diabetes education:

- Module 1: Diabetes Basics** (Yellow cover)
- Module 2: Insulintherapie off-line** (Orange cover)
- Module 3: Diabetes Specials** (Green cover)
- Module 4: Pumpentherapie** (Blue cover)
- Didaktischer Leitfaden** (Light blue cover)

MHH Modulares Schulungskonzept
Karin Lange / Wolfgang von Schütz

Modulares Schulungskonzept: Pädiatrie

Konzept ModuS:
 Modulare Patientenschulung
 Für diverse seltene chronische Krankheiten im Kindes- und Jugendalter
generisches Modul plus
krankheitsspezifische Module
 (PKU, Nephrotisches Syndrom, chron. Bauchschmerz, CF, CED, Harninkontinenz, PID, Zöliakie, primäre Ziliendyskinesie, Sichelzellenanämie, Diabetes Typ 1, Asthma und weitere)

MHH Modulares Schulungskonzept
Karin Lange / Wolfgang von Schütz
 Gefördert durch: Bundesministerium für Gesundheit
 auf Grundlage eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

ModuS: modulare Patientenschulung

Tabelle: Übersicht über die Basismodule von ModuS

Modul	generisch vs. spezifisch
0. Organisation und Vorbereitung	generisch
I. Einleitung: Begrüßung und Kennenlernen	generisch
II. Motivierende Aufklärung zu Krankheit, Behandlung und Prognose	spezifisch
III: Kompetenzen und Motivation für das symptomarme Intervall	spezifisch
IV: Kompetenzen für die Regulation und Vermeidung akuter Krisen: Notfallmanagement	spezifisch
V: Krankheitsbewältigung im Familiensystem	generisch
VI: Abschluss: Zusammenfassung, Ausblick, Ausklang	generisch

MHH Modulares Schulungskonzept
Karin Lange / Wolfgang von Schütz

ModuS: modulare Patientenschulung

- Handbücher krankheitsübergreifend
- Krankheitsspezifische Curricula / Programme
- Trainer-Seminare

Pabst-Verlag (2013)
Als pdf-Datei kostenlos herunterzuladen (open access)
www.patientenschulung-kompas.de

KomPaS
Kompetenznetz Patientenschulung

Kompetenznetz Patientenschulung im Kindes- und Jugendalter e.V.

MHH Medizinische Hochschule Hannover
Karin Lange / Wolfgang von Schütz

Das Elternprogramm für Familien von Kindern mit Diabetes

Delfin

Wie sag ich's meinem Kinde – Umsetzen der Diabetesbehandlung im Familienalltag

Dr. Heike Saßmann
Dieses Projekt wurde mit dem Menarini-Förderpreis der Deutschen Diabetes Gesellschaft, gestiftet von der Berlin-Chemie AG, finanziert.

MHH Medizinische Hochschule Hannover
Karin Lange / Wolfgang von Schütz

Das Elternprogramm für Familien von Kindern mit Diabetes

Delfin

Elternkurs:

- Sitzung 1: Das Fundament einer vertrauensvollen Beziehung
- Sitzung 2: Wie Eltern und Kinder ticken
- Sitzung 3: Kindern sagen, was sie tun oder lassen sollen
- Sitzung 4: Typische Herausforderungen des Diabetes
- Sitzung 5: Gewappnet sein
- Sitzung 6: Individueller Telefonkontakt

MHH Medizinische Hochschule Hannover
Karin Lange / Wolfgang von Schütz

Stand: DELFIN-Programm

- Arbeitsbuch für Eltern
- Leitfaden für Trainer
- Ausbildungsseminare für Trainer 2014
- Evaluation in 2014

Kontakt:
Dr. Heike Saßmann
Medizinische Hochschule Hannover
sassmann.heike@mh-hannover.de

Diese Projekt wird gefördert von: **BERLIN-CHEMIE MENARINI**

"FIT FÜR DIE SCHULE"

Strukturierte Schulung zur Vorbereitung auf die Schule
ein ambulantes Curriculum über 2 Tage

Kerstin Remus & Sarah Bläsig
Diabetesberaterinnen DDG
Kinder- und Jugend- Krankenhaus Auf der Bult

„FIT FÜR DIE SCHULE“

- 2-tägiger ambulanter Schulungskurs, für Kinder, die in diesem Jahr eingeschult werden
- Zeit: 1. Tag 9:00 Uhr - 15:00 Uhr; 2. Tag 9:00 Uhr – 17:00 Uhr
- Handbuch mit Curriculum, Arbeitsmaterialien, Checklisten zur Vorbereitung und Durchführung, Elternberatung
- interaktives Konzept ohne Zahlenverständnis und Lesefähigkeit
- in Vorbereitung (Verlag Kirchheim)

Beispiel: Vorbereitung

- Aushang in der Diabetesambulanz, Bekanntgabe auf der Internetseite des Zentrums, direkte Ansprache der Eltern
- Eltern melden an / Kinder erhalten Bestätigungsbrief (Termin, alle Diabetesutensilien, Therapieplan,
Zwischenmahlzeiten, Eltern nehmen nicht teil, Eltern Handy-Nr., Einwilligung zum Verlassen des Klinikgeländes/Fotoaufnahmen, Regenkleidung)
- Ausschlusskriterien: Kind möchte nicht teilnehmen
- Abrechnung: ambulante Schulung (DMP) und Spenden (Zoo), ggf. Eigenanteil der Eltern
Personal: 2 Diabetesberaterinnen, die alle Kinder gut kennen (ggf. Hospitanten)
- Akten der Kinder kennen, Teamabstimmung
- Vorbereitung auf Notfälle (Hypos, Ketoazidose, fehlende Diabetesutensilien)
- Unterrichtsmaterialien (Arbeitsblätter, Bastelmaterial, Papier, kein ppt. etc!
Absprache Mittagessen, Kinder wählen selbst aus
- Verhaltensregeln für Kinder: nie allein den Raum verlassen, Traubenzucker, DB immer ansprechen (Unwohlsein, essen, Toilette,...)

Lernziele

- Was ist Diabetes? (Symptome, Ursachen, Behandlung, Schulfrage altersgemäß verstehen)
- Anderen erzählen können, dass man Diabetes hat und was es ist.
- Korrekt Blutzucker messen können (Technik, Interpretation des Ergebnisses, Verhalten)
- Wie verhalte ich mich beim Sportunterricht? (Extra-KE, Hypo)
- Was ist eine Hypo und woran erkenne ich sie? (Wissen und Handeln)
- Wie behandle ich eine Hypoglykämie und wie Sorge ich vor? (Notfallbox kennen und nutzen können)
- Wie gehe ich mir Insulin? (mit Unterstützung Katheter setzen oder Insulin mit Pen injizieren können)
- Was muss ich beim Klassenausflug beachten? (wissen, was mitgenommen werden muss, welche Absprachen mit Betreuern wichtig sind, Sicherheitsregeln umsetzen können)

Informationsstunde für die Eltern

- Rückmeldung an die Eltern über Inhalt und Vermittlung
- Strukturierte Rückmeldung an die Eltern:
 - zum Entwicklungsstand des Kindes (in der Gruppe und individuell)
 - zum Unterstützungsbedarf des Kindes
 - Übungsanregungen für Zuhause
 - Schulungsangebot für die Lehrer mitteilen
 - Lehrerbroschüre ausgeben

CGM-Schulungsprogramm: Pädiatrie

aktueller Stand:

- Dr. Martin Holder (Stuttgart) koordiniert die Entwicklung des Programms für die AGPD
- in Zusammenarbeit mit dem Programm für Erwachsene (AGDT)
- Themen und Lernziele sind definiert
- Materialien und Unterlagen werden entwickelt (Bernhard Gehr Traunstein, Ulrike Thurm, Berlin u. andere)
- Evaluation ist geplant
- Fertigstellung? <http://www.diabetes-technologie.de/glukosemonitoringliteraturhinweise.htm>.

Karin Lange / Wolfgang von Schütz

Vielen Dank!

Karin Lange / Wolfgang von Schütz

T. Battelino, Ljubiana, Slovenien

The future of glucose sensing

The future of glucose sensing

Tadej Battelino
University Medical Center
Ljubljana, Slovenia

Hannover, Jan. 11th, 2014

University Children's Hospital Ljubljana

Declaration of potential conflicts of interest:

T. Battelino's institution has received research grant support, with receipt of travel and accommodation expenses in some cases, from Abbott, Medtronic, Novo Nordisk, Eli Lilly, GluSense and Diamyd.

T. Battelino received honoraria for participating on the speaker's bureaux of Eli Lilly, Novo Nordisk, Bayer, Roche and Medtronic, and consulting fees as a member of scientific advisory boards from Bayer, LifeScan, Eli Lilly, Sanofi-Aventis and Medtronic.

- Introduction
- Rationale
- Evidence
- Vision

The incidence of type 1 diabetes in Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina) and Slovenia in the period 1998–2010

UCH Ljubljana – All patients with T1D, 0 – 21 years old

	Year											
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
DKA												
N	6	3	3	3	2	3	7	6	1	8	3	9
Rate^a	2.18 (0.80– 4.75)	0.94 (0.19– 2.74)	0.82 (0.17– 2.41)	0.77 (0.16– 2.25)	0.48 (0.06– 1.73)	0.69 (0.14– 2.03)	1.58 (0.64– 3.26)	1.31 (0.48– 2.84)	0.20 (0.01– 1.14)	1.68 (0.72– 3.30)	0.61 (0.12– 1.77)	1.90 (0.87– 3.60)
SH												
N	6	4	7	3	4	5	4	4	6	9	3	6
Rate^a	2.18 (0.80– 4.75)	1.25 (0.34– 3.21)	1.92 (0.77– 3.96)	0.77 (0.16– 2.25)	0.96 (0.26– 2.45)	1.16 (0.38– 2.70)	0.90 (0.25– 2.31)	0.87 (0.24– 2.23)	1.22 (0.45– 2.67)	1.89 (0.86– 3.58)	0.61 (0.12– 1.77)	1.27 (0.46– 2.76)
Patient-years at risk	275	319.5	364.5	389	417.5	432.5	443	459.5	490	477	495.5	474

Diabetes Technol Ther 2013; Oct 16

CGM

Improved Glycemic Control in Poorly Controlled Patients with Type 1 Diabetes Using Real-Time Continuous Glucose Monitoring

DOROTHEE DEISS, MD¹
JAN BOLINDER, MD, PHD²
JEAN-PIERRE RIVELINE, MD³
TADEJ BATTALINO, MD, PHD⁴

EMANUELE BOSI, MD, PHD⁵
NADIA TUBIANA-RUFFI, MD⁶
DAVID KERR, MD⁷
MOSHE PHILLIP, MD⁸

perglycemia with the upper alarm lowering to 200 mg/dl after the first 10 days. Settings could be readjusted during the study.

DIABETES CARE, VOLUME 29, NUMBER 12, DECEMBER 2006

ORIGINAL ARTICLE

Continuous Glucose Monitoring and Intensive Treatment of Type 1 Diabetes

The Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group*

N Engl J Med 2008;359.

N Engl J Med 2008;359.

Factors Predictive of Use and of Benefit from Continuous Glucose Monitoring in Type 1 Diabetes

Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group*

Diabetes Care. 2009 Nov;32(11):1947-53

The NEW ENGLAND
JOURNAL of MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE

Effectiveness of Sensor-Augmented Insulin-Pump Therapy in Type 1 Diabetes

Richard M. Bergenstal, M.D., William V. Tamborlane, M.D.,
 Andrew Ahmann, M.D., John B. Buse, M.D., Ph.D., George Dailey, M.D.,
 Stephen N. Davis, M.D., Carol Joyce, M.D., Tim Peoples, M.A.,
 Bruce A. Perkins, M.D., M.P.H., John B. Welsh, M.D., Ph.D.,
 Steven M. Willi, M.D., and Michael A. Wood, M.D., for the STAR 3 Study Group*

A1C Reduction Seen Early and Sustained for All Patients

- The SAP group achieved a greater A1C reduction vs. MDI at 3 months and sustained it over 12 months

A1C Reduction for SAP and MDI Groups

Values are means $\pm$ SE. Comparisons between SAP group and MDI group are significant for each time period ($P < 0.001$).

Page 17

Improved Glycemic Control in Pediatrics Using SAP

- SAP group demonstrated a 0.5% A1C reduction at 12 months vs. MDI

Values are means $\pm$ SE. Comparisons between SAP group and MDI group are significant for each time period ($P < 0.001$).

Page 18

Assessment of Patient-Led or Physician-Driven Continuous Glucose Monitoring in Patients With Poorly Controlled Type 1 Diabetes Using Basal-Bolus Insulin Regimens

A 1-year multicenter study

Diabetes Care 35:965–971, 2012

JEAN-PIERRE RIVELINE, MD^{1,2}
 PAULINE SCHAEPELYNCK, MD³
 LUCY CHAILLOUS, MD, PHD⁴
 ERIC RENARD, MD, PHD⁵
 AGNÈS SOLA-GAZAGNES, MD⁶
 ALFRED PENFORNIS, MD, PHD⁷
 NADIA TUBIANA-RUFI, MD⁸
 VÉRONIQUE SULMONT, MD⁹
 BOGDAN CATARGI, MD, PHD¹⁰
 CELINE LUKAS, MD¹¹
 REGIS P. RADERMECKER, MD¹²

CHARLES THIVOLET, MD, PHD¹³
 FRANÇOIS MOREAU, MD¹⁴
 PIERRE-YVES BENHAMOU, MD, PHD¹⁵
 BRUNO GUERCI, MD, PHD¹⁶
 ANNE-MARIE LEGUERRIER, MD¹⁷
 LUC MILLOT, MD¹⁸
 CLAUDE SACHON, MD¹⁹
 GUILLAUME CHARPENTIER, MD¹
 HÉLÈNE HANAIRE, MD²⁰
 FOR THE EVADIAC SENSOR STUDY GROUP

Since the report of the Diabetes Control and Complications Trial (1), so-called intensive insulin therapy has been considered the gold standard for patients with type 1 diabetes, together with frequent monitoring of blood glucose, patient education about diabetes management, and close follow-up and the attending health care team.

Diabetes Care 35:965–971, 2012

Separately significant for CSII but NS for MDI

Effect of Continuous Glucose Monitoring on Hypoglycemia in Type 1 Diabetes

TADEJ BATTELINO, MD, PHD¹
 MOSHE PHILLIP, MD²
 NATASA BRATINA, MD, PHD¹

REVITAL NIMRI, MD²
 PER OSKARSSON, MD, PHD³
 JAN BOLINDER, MD, PHD³

especially useful in patients with hypoglycemia unawareness and/or frequent episodes of hypoglycemia (18). However

Diabetes Care 34:1–6, 2011

Primary endpoint:

- Time spent in hypoglycemia < 63 mg% = 3.5 mM

Secondary endpoints:

- HbA1c
- Glycemic measures

Variable	Control group	Continuous monitoring group	Ratio of means	95% CI for ratio of means	P
N	54	62			
Hours per day in hypoglycemia <63 mg/dL Median (interquartile range)	0.97 ± 1.55 0.54 (0.23-1.31)	0.48 ± 0.57 0.26 (0.14-0.54)	0.49	0.26-0.76	0.03
Number of hypoglycemic excursions per day <63 mg/dL	0.76 ± 0.94	0.53 ± 0.60	0.70	0.43-1.03	0.08
Integrated glucose excursion index (area under the curve) <63 mg/dL	11.1 ± 14.2	5.4 ± 7.6	0.49	0.29-0.79	0.02
Hours per day in hypoglycemia <55 mg/dL	0.41 ± 0.48	0.22 ± 0.34	0.55	0.34-0.91	0.05
Number of hypoglycemic excursions per day <55 mg/dL	0.37 ± 0.40	0.28 ± 0.54	0.76	0.47-1.43	0.07
Hours per day in hypoglycemia <70 mg/dL	1.60 ± 2.02	0.91 ± 0.81	0.57	0.36-0.80	0.01
Low blood glucose index	1.74 ± 1.62	1.18 ± 0.82	0.68	0.49-0.89	0.02
Hours per day in hyperglycemia					

	Control	CGM	p
N	54	62	
Hours < 63 mg/dL	0.97 ± 1.55	0.48 ± 0.57	0.03

Prospectively Determined Impact of Type 1 Diabetes on Brain Volume During Development

Dana C. Perantie,¹ Jonathan M. Koller,¹ Patrick M. Weaver,¹ Heather M. Lugar,¹ Kevin J. Black,^{1,2,3,4} Neil H. White,^{5,6} and Tamara Hershey^{1,2,3}

DIABETES, VOL. 60, NOVEMBER 2011

- Longitudinal, prospective structural neuroimaging study of youth with T1DM ($n = 75$; mean age = 12.5 years) and their nondiabetic siblings ($n = 25$; mean age = 12.5 years).
- Each participant was scanned twice, separated by 2 years.
- Blood glucose control measurements (HbA_{1c} , glucose meter results, and reports of severe hypoglycemia) were acquired during the 2-year follow-up.

White Matter Microstructural Integrity in Youth With Type 1 Diabetes

Diabetes 62:581–589, 2013

Jo Ann V. Antenor-Dorsey,¹ Erin Meyer,² Jerrel Rutlin,¹ Dana C. Perantie,¹ Neil H. White,⁴ Ana Maria Arbelaez,⁴ Joshua S. Shimony,³ and Tamara Hershey^{1,2,3}

	Control subjects N = 30	T1DM subjects N = 73	Among T1DM group (n = 73)					
			Severe hyper episodes			Severe hypo episodes		
			None n = 41	1-2 n = 21	3+ n = 11	None n = 27	1-2 n = 30	3+ n = 16
Age, years (SD)	15.9 (3.4)	16.8 (2.9)	16.9 (2.8)	16.2 (3.3)	17.4 (2.5)	16.6 (3.0)	16.7 (2.7)	17.1 (3.4)
Sex, n (% female)	15 (50)	29 (40)	17 (41)	8 (38)	4 (36)	8 (30)	14 (47)	7 (44)
Race, n (% Caucasian)†	27 (90)	65 (90)	37 (90)	21 (100)	7 (64)†	25 (93)	27 (90)	13 (81)
Handedness, n (% right handed)**	29 (97)	63 (86)**	35 (85)	20 (95)	8 (73)	23 (85)	26 (87)	14 (88)
Parental education, years (SD)	15.4 (1.9)	15.2 (2.1)	15.3 (2.3)	15.2 (1.6)	14.7 (1.7)	14.4 (1.9)	15.7 (2.0)	15.3 (2.1)
T1DM duration, years (SD)§	NA	9.5 (2.9)	9.1 (2.6)	9.9 (3.5)	9.9 (3.1)	7.9 (2.2)§	10.2 (3.0)	10.6 (2.9)
Age of T1DM onset, years (SD)‡	NA	7.2 (3.1)	7.8 (3.4)	6.1 (2.6)	7.5 (2.6)	8.5 (3.2)‡	6.5 (2.9)	6.5 (3.0)
HbA _{1c} , median (SD)*	NA	8.3 (1.0)	8.2 (0.8)	8.2 (1.0)	9.1 (1.4)	8.3 (1.0)	8.1 (0.7)	9 (1.3)*
Weighted HbA _{1c} , mean (SD)#	NA	-0.04 (1.3)	-0.26 (1.2)	-0.04 (1.4)	0.87 (1.3)	-0.63 (1.08)	-0.02 (1.14)	0.91 (1.64)#
Blood glucose at time of scan, mean mg/dL (SD)	NA	193.44 (91.8)	207.1 (89.6)	173.5 (96.8)	180 (90.0)	193.9 (89.1)	173 (83.1)	233.5 (104.9)

TBSS results comparing axial diffusivity maps which were reduced in T1DM youth compared with control subjects

Diabetes 62:581–589, 2013

- A history of three or more severe **hyperglycemic** episodes was associated with reduced anisotropy and increased diffusivity in the **superior parietal lobule** and increased diffusivity in the **hippocampus**.
- youth with type 1 diabetes exhibit a pattern of regional DTI differences that is suggestive of axonal injury or degeneration, some of which may be related to severe **hyperglycemic** exposure.

Diabetes 62:581–589, 2013

Case Report

Diabet. Med. 30, e151–e156 (2013)

Hypoglycaemia-induced changes in regional brain volume and memory function

B. A. Kirchoff¹, H. M. Lugar², S. E. Smith¹, E. J. Meyer², D. C. Perantie², B. C. Kolody², J. M. Koller², A. M. Arbelaez³, J. S. Shimony⁴ and T. Hershey^{2,4,5}

- **hypoglycaemia** - permanent deleterious effects on brain structure and memory function
- subcortical grey matter, periventricular white matter and posterior white matter - most susceptible to injury from **hypoglycaemia**
- structural damage to the **hippocampus** and **isthmus of the cingulate** - hypoglycaemia-induced memory impairments

Sensor augmented pump therapy from onset of type 1 diabetes: late follow-up results of the Pediatric Onset Study

Pediatric Diabetes 2012
doi: 10.1111/j.1399-5448.2012.00863.x

Olga Kordonouri^a, Reinhard Hartmann^a, Ewa Pankowska^b, Birgit Rami^c, Thomas Kapellen^d, Régis Coutant^e, Karin Lange^f and Thomas Danne^a

Pediatric Diabetes 2012
doi: 10.1111/j.1399-5448.2012

Absolute fasting values at 24 months:

SAP: 0.13±0.17 nmol/L

Control: 0.09±0.10 nmol/L

ARTICLE

The use and efficacy of continuous glucose monitoring in type 1 diabetes treated with insulin pump therapy: a randomised controlled trial

T. Battelino · I. Conget · B. Olsen · I. Schütz-Fuhrmann ·
E. Hommel · R. Hoogma · U. Schierloh · N. Sulli ·
J. Bolinder · the SWITCH Study Group

The SWITCH Study Group

Steno Diabetes Center, Copenhagen
Glostrup Hospital

Italy

Clinica Pediatrica, Policlinico Umberto,
Rome

Luxembourg

Center Hospitalier de Luxembourg

Netherlands

Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

Slovenia

University Medical Center Ljubljana,

Results: HbA1c is significantly decreased with the addition of CGM to CSII.

Population	A1c drop	Std Error	95% CI	P-value
Overall	-0.43	0.059	0.32-0.55	<0.001
Children (mean age = 12.4y)	-0.46	0.100	0.26-0.66	<0.001
Adults (mean age = 27.9y)	-0.41	0.064	0.28-0.53	<0.001

This significant decrease was observed in the overall group and in age-related subgroups.

Severe Hypoglycemia and A1C: DCCT¹⁵ (1993), JDRF² (2008), and STAR 3¹⁶ (2010) Studies

- **DCCT (intensive therapy):**
62 per 100 pt-yrs,
A1C(6.5 yr): 9.0% → 7.2%
- **JDRF CGM (adults, 1 subject excluded):**
20.0 per 100 pt-yrs;
A1C (6 mo): 7.5% → 7.1%
- **STAR 3 SAP (all ages):**
13.3 per 100 pt-yrs;
A1C (1 yr): 8.3% → 7.5%
- ★ **SWITCH – ON (all ages):**
6.1 per 100 pt-yrs;
A1C (6 mo): 8.4% → 8.0%

15. Adapted from Figure 5B of: DCCT. *N Engl J Med.* 1993;329:977-986.

2. JDRF data from: JDRF CGM Study Group. *N Engl J Med.* 2008;359:1465-1476.

16. Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, et al. [published online ahead of print June 29, 2010]. *N Engl J Med.* doi: 10.1056/NEJMoa1002853.

Pediatric Diabetes

*Pediatric Diabetes 2012
doi: 10.1111/j.1399-5448.2011.00849.x
All rights reserved*

Consensus Statement

**Use of continuous glucose monitoring
in children and adolescents***

Phillip M, Danne T, Shalitin S, Buckingham B, Laffel L,
Tamborlane W, Battelino T, for the Consensus Forum
Participants. Use of continuous glucose monitoring in
children and adolescents.
Pediatric Diabetes 2012.

Conclusions CGM

- **Is safe in all age groups**

**improves metabolic
control**

Reduces hypoglycemia

Success depends on use!

**Why so many
differences??**

CGM with Low Glucose Suspend

11 months

Veo from
disease
onset

Prolonged nocturnal hypo

Until
midnight

- Auto suspend - full 2 hours
- Hypo not appreciated by the parents
- Veo prevented severe hypo?
- Recovery to euglycemia

Emerging Treatments and Technologies
BRIEF REPORT

Insulin Pump Therapy With Automated Insulin Suspension in Response to Hypoglycemia

Diabetes Care 34:2023–2025, 2011

Reduction in nocturnal hypoglycemia in those at greatest risk

PRATIK CHOUDHARY, MD¹
JOHN SHIN, PHD²
YONGYIN WANG, PHD²
MARK L. EVANS, MD³
PETER J. HAMMOND, FRCP⁴

DAVID KERR, FRCPE⁵
JAMES A.M. SHAW, PHD⁶
JOHN C. PICKUP, FRCPATH¹
STEPHANIE A. AMIEL, FRCP¹

threshold set by the user. An alarm sounds, and if the user does not respond, basal insulin delivery is suspended for a maximum of 2 h, after which basal insulin delivery is resumed at the programmed

- 31 patients (10 male) with T1D (mean age, 41.9 ± 10.6 years)
- 2-week run-in - LGS-OFF plus 3 weeks LGS-ON
- quartiles by the duration of hypoglycemia during the run-in period LGS-OFF
- Hypoglycemia: sensor <2.2 mmol/L
- glucose threshold to trigger LGS: median 2.4 [range 2.2–3.5] mmol/L)
- Night: 0000–0800 h

Prevention of Hypoglycemia by Using Low Glucose Suspend Function in Sensor-Augmented Pump Therapy

Diabetes Tech Therap 2011;13:1129-34

Thomas Danne, M.D.,¹ Olga Kordonouri, M.D.,¹ Martin Holder, M.D.,² Holger Haberland, M.D.,³
Sven Golembowski, M.D.,³ Kerstin Remus, R.N.,¹ Sara Bläsigg, R.N.,¹ Tanja Wadien, R.N.,²
Susanne Zierow, R.N.,³ Reinhard Hartmann, M.D.,⁴ and Andreas Thomas, Ph.D.⁵

21 children and adolescents
2 weeks LGS-OFF + 6 weeks LGS-ON (< 3.9 mM)

TABLE 1. COMPARISON OF GLYCEMIC PARAMETERS USING THE INSULIN PUMP WITH LOW GLUCOSE SUSPEND (PHASE 2) VERSUS INSULIN PUMP WITHOUT LOW GLUCOSE SUSPEND (PHASE 1) IN PEDIATRIC PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES

	Phase 1 (without LGS)	Phase 2 (with LGS)	P (t test)
Mean glucose value (mg/dL)	145.29 ± 22.99	148.43 ± 19.44	NS (0.30)
SD (mg/dL)	54.67 ± 10.03	55.62 ± 10.75	NS (0.48)
AUC >140 mg/dL (mg/dL × day)	25.51 ± 14.38	28.20 ± 13.99	NS (0.15)
Time >140 mg/dL /day (min)	651 ± 240	639 ± 182	NS (0.50)
AUC <70 mg/dL (mg/dL × day)	0.76 ± 0.61	0.53 ± 0.37	0.05
Time <70 mg/dL /day (min)	101 ± 68	58 ± 33	0.002
Excursions			
<70 mg/dL /day 0 a.m.–12 p.m.	1.27 ± 0.75	0.95 ± 0.49	0.01
<70 mg/dL /day 6 a.m.–10 p.m.	0.82 ± 0.41	0.61 ± 0.39	0.01
<70 mg/dL /day 10 p.m.–6 a.m.	0.45 ± 0.34	0.34 ± 0.22	0.01
≤40 mg/dL / day 0 a.m.–12 p.m.	0.28 ± 0.18	0.13 ± 0.14	0.005
<40 mg/dL /day 6 a.m.–10 p.m.	0.17 ± 0.15	0.06 ± 0.10	0.01
<40 mg/dL /day 10 p.m.–6 a.m.	0.11 ± 0.13	0.07 ± 0.10	0.002

AUC, area under the curve; LGS, low glucose suspend; NS, not statistically significant.

Reduction in Duration of Hypoglycemia by Automatic Suspension of Insulin Delivery: The In-Clinic ASPIRE Study

Diabetes Tech Therap 2012;14:205-9

Satish Garg, M.D.¹ Ronald L. Brazg, M.D.,² Timothy S. Bailey, M.D.,³
Bruce A. Buckingham, M.D.,⁴ Robert H. Slover, M.D.,¹ David C. Klonoff, M.D.,⁵ John Shin, Ph.D.,⁶
John B. Welsh, M.D., Ph.D.,⁶ and Francine R. Kaufman, M.D.⁶

<i>Characteristic</i>	<i>LGS-On → LGS-Off</i>	<i>LGS-Off → LGS-On</i>	<i>Both groups</i>
<i>n</i>	25	25	50
Age (years) (mean ± SD)	34.5 ± 12.2	34.1 ± 12.7	34.3 ± 12.4
Male (%)	56	56	56
BMI (kg/m ²) (mean ± SD)	27.7 ± 3.8	26.2 ± 4.6	26.9 ± 4.3
A1C (%) (mean ± SD)	8.0 ± 0.6	7.8 ± 0.5	7.9 ± 0.6

Diabetes Tech Therap 2012;14:205-9

Duration of hypoglycemia LGS-On vs. LGS-Off

138 ± 76.88 vs. 170.7 ± 75.91 min, P=0.006

Severity of hypoglycemia LGS-On vs. LGS-Off

59.6 ± 5.72 vs. 57.6 ± 5.69 mg/dL, P=0.015

ORIGINAL ARTICLE

Threshold-Based Insulin-Pump Interruption for Reduction of Hypoglycemia

Richard M. Bergenstal, M.D., David C. Klonoff, M.D., Satish K. Garg, M.D., Bruce W. Bode, M.D., Melissa Meredith, M.D., Robert H. Slover, M.D., Andrew J. Ahmann, M.D., John B. Welsh, M.D., Ph.D., Scott W. Lee, M.D., and Francine R. Kaufman, M.D., for the ASPIRE In-Home Study Group*

This article was published on June 22, 2013

N Engl J Med 2013;369:224-32

Table 1. Baseline Characteristics of the Patients Who Underwent Randomization.*

Characteristic	Threshold-Suspend Group (N = 121)	Control Group (N = 126)
Age (yr)		
Mean	41.6±12.8	44.8±13.8
Range	16–69	16–70
Duration of diabetes (yr)	27.1±12.5	26.7±12.7
Male sex (%)	38.0	39.7
Weight (kg)	79.6±15.9	79.1±15.1
Body-mass index†	27.6±4.7	27.1±4.3
Glycated hemoglobin at randomization (%)	7.26±0.71	7.21±0.77

N Engl J Med 2013;369:224-32

Significant reduction of hypoglycaemia events with LGS vs SAP alone, overnight and also during the full 24 hours

N Engl J Med 2013;369:224-32.

N Engl J Med 2013;369:224-32.

Low risk of severe rebound hyperglycaemia with LGS activation

No significant differences in the change in HbA1c (SAP + LGS vs SAP alone) :

LGS Active	Glucose (mean±SD)
2h post-suspend (at insulin resume)	92.6 ± 40.7 mg/dL
2h post-resume (4h after beginning of LGS event)	168.8 ± 64.6 mg/dL.

N Engl J Med 2013;369:224-32

Original Investigation

Effect of Sensor-Augmented Insulin Pump Therapy and Automated Insulin Suspension vs Standard Insulin Pump Therapy on Hypoglycemia in Patients With Type 1 Diabetes A Randomized Clinical Trial

JAMA. 2013;310(12):1240-1247.

Trang T. Ly, MBBS, DCH, FRACP; Jennifer A. Nicholas, RN, CDE, MSc(Nursing); Adam Retterath, BSc(Biomed)(Hons); Ee Mun Lim, MBBS, FRCPA, FRACP; Elizabeth A. Davis, MBBS, FRACP, PhD; Timothy W. Jones, MBBS, FRACP, MD

Table 1. Baseline Characteristics of Study Participants

	No. (%) of Participants	
	Insulin Pump (n = 49)	Sensor-Augmented Pump With Low-Glucose Suspension (n = 46)
Age, mean (SD) [range], y	19.7 (12.9) [5.4-48.6]	17.4 (10.6) [5.1-45.7]
Female	28 (57.1)	20 (43.5)
Age group, y		
4-<7	2 (4.1)	2 (4.3)
7-<12	14 (28.6)	13 (28.3)
12-<18	18 (36.7)	16 (34.8)
18-50	15 (30.6)	15 (32.6)
Duration of diabetes, mean (SD), y	12.1 (10.0)	9.8 (7.4)
Duration of pump therapy, mean (SD), y	4.4 (3.4)	3.8 (3.3)
Insulin/kg, mean (SD), U/kg	0.76 (0.23)	0.83 (0.17)
Hypoglycemia unawareness score, mean (SD)	6.4 (1.5)	5.9 (1.5)

JAMA. 2013;310(12):1240-1247.

	Insulin Pump (n = 49)	Sensor-Augmented Pump With Low-Glucose Suspension (n = 46)
Sum of Severe and Moderate Hypoglycemia		
Baseline		
Rate per 100 patient-months (95% CI) ^a	20.7 (13.8 to 30)	129.6 (111.1 to 150.3)
No. of events (total No. of patients)	28 (45)	175 (45)
End point		
6-Month rate per 100 patient-months (95% CI) ^a	11.9 (6.8 to 19.3)	28.4 (19.8 to 39.6)
No. of events (total No. of patients)	13 (45)	35 (41)
Incidence rate per 100 patient-months (95% CI) ^b	34.2 (22.0 to 53.3)	9.5 (5.2 to 17.4)
Patients modeled	45	41
Incidence rate ratio per 100 patient-months (95% CI) ^b		3.6 (1.7 to 7.5)
P value		< .001
Glycated hemoglobin, %		
Baseline, mean (95% CI)	7.4 (7.2 to 7.6)	7.6 (7.4 to 7.9)
End point, mean (95% CI)	7.4 (7.2 to 7.7)	7.5 (7.3 to 7.7)
Change, least square mean (95% CI) ^c	-0.06 (-0.2 to 0.09)	-0.1 (-0.3 to 0.03)
P value	.42	.11
Least square mean difference (95% CI) ^c		0.07 (-0.2 to 0.3)
P value		.55

JAMA. 2013;310(12):1240-1247.

Severe hypoglycemia^a		
Baseline		
Rate per 100 patient-months (95% CI)	2.1 (0.8 to 4.6)	1.8 (0.6 to 4.3)
No. of events (total No. of patients)	6 (49)	5 (46)
End point		
6-Month rate per 100 patient-months (95% CI)	2.2 (0.5 to 6.5)	0 (0 to 2.4)
No. of events (total No. of patients)	6 (45)	0 (41)
Incidence rate difference from baseline to end point (95% CI)		1.5 (0.3 to 2.7)
P value		.02
Moderate hypoglycemia		
Baseline		
Rate per 100 patient-months (95% CI)	20 (13.2 to 29.1)	128.1 (109.8 to 148.7)
No. of events (total No. of patients)	27 (45)	173 (45)
End point		
6-Month rate per 100 patient-months (95% CI)	9.6 (5.1 to 16.5)	28.5 (19.8 to 39.6)
No. of events (total No. of patients)	13 (45)	35 (41)
Incidence rate per 100 patient-months (95% CI) ^b	26.3 (15.4 to 45.0)	9.6 (5.1 to 18.1)
Patients modeled	45	41
Incidence rate ratio per 100 patient-months (95% CI) ^b		2.7 (1.2 to 6.1)
P value		.01

	Median (Interquartile Range)		P Value ^a
	Insulin Pump	Sensor-Augmented Pump With Low-Glucose Suspension	
Average time of glucose levels <70 mg/dL^b			
Day			
Baseline	8.3 (2.8-13.0)	5.7 (2.8-8.2)	.15
End point	6.9 (3.9-10.6)	4.1 (2.6-7.6)	.02
Night			
Baseline	11.1 (3.1-21.3)	7.3 (2.4-16.4)	.20
End point	11.8 (6.4-16.2)	4.4 (2.1-8.8)	<.001
Average time of glucose levels <60 mg/dL^b			
Day			
Baseline	3.2 (0.7-9.0)	2.4 (0.4-4.4)	.15
End point	3.3 (1.6-5.9)	1.5 (0.9-3.7)	.01
Night			
Baseline	4.8 (0-12.9)	2.3 (0-9.5)	.38
End point	6.2 (4.2-9.9)	2.4 (0.4-5.3)	<.001

MESSAGE FOR OUR ROUTINE PRACTICE

Automated insulin suspend helps!

Adding benefit of:

CSII and

CGM to

SAP/LGS (CE & FDA)

And finally to the

Closed Loop AP

**Alternative sensor
technology ?**

All Patients (horizontal shift)

MARD= 14.055

Correlation Coefficient= 0.938

Total number of paired points= 516 (79 points excluded- total of blood tests 598)

Glucose Range	Number of Points	A+B	A	B	C	D	E
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
40-60	72.00	68.00	65.00	3.00	0.00	4.00	0.00
	13.95	94.44	90.20	4.17	0.00	5.56	0.00
80-120	45.00	45.00	35.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	0.72	100.00	77.70	22.22	0.00	0.00	0.00
120-240	109.00	108.00	70.00	38.00	1.00	0.00	0.00
	21.12	99.08	64.22	34.86	0.02	0.00	0.00
240-<	287.00	284.00	239.00	45.00	2.00	1.00	0.00
	55.62	98.05	83.28	15.68	0.70	0.35	0.00
Overall	516.00	507.00	411.00	96.00	3.00	6.00	0.00
	100.00	90.26	79.65	10.60	0.50	1.16	0.00

79 points excluded- points that did not meet the criteria of calibration, and points from day 4 of patient 103

Closed Loop

The Effect of Insulin Feedback on Closed Loop Glucose Control

J Clin Endocrin Metab. First published ahead of print March 2, 2011 as doi:10.1210/jc.2010-2578

Garry M. Steil, Cesar C. Palerm, Natalie Kurtz, Gayane Voskanyan, Anirban Roy, Sachiko Paz, and Fouad R. Kandeel
J Clin Endocrinol Metab, May 2011, 96(5)

Children's Hospital Boston (G.M.S.), Boston, Massachusetts 02115; Medtronic MiniMed (C.C.P., N.K., G.V., A.R.), Northridge, California 91325; and City of Hope (S.P., F.R.K.), Duarte, California 91010

Fully Integrated Artificial Pancreas in Type 1 Diabetes Modular Closed-Loop Glucose Control Maintains Near Normoglycemia

DIABETES, VOL. 61, SEPTEMBER 2012

Marc Breton,¹ Anne Farret,² Daniela Bruttomesso,³ Stacey Anderson,¹ Lalo Magni,⁴ Stephen Patek,¹ Chiara Dalla Man,⁵ Jerome Place,² Susan Demartini,¹ Simone Del Favero,⁵ Chiara Toffanin,⁴ Colleen Hughes-Karvetski,¹ Eyal Dassau,^{6,7} Howard Zisser,^{6,7} Francis J. Doyle III,⁶ Giuseppe De Nicolao,⁴ Angelo Avogaro,³ Claudio Cobelli,⁵ Eric Renard,² and Boris Kovatchev,¹ on behalf of The International Artificial Pancreas (IAP) Study Group

Closed-Loop Insulin Therapy Improves Glycemic Control in Children Aged <7 Years

A randomized controlled trial *Diabetes Care* 36:222–227, 2013

ANDREW DAUBER, MD, MMSC¹
LIAT CORCIA, MD²
JASON SAFER, BS¹

MICHAEL S.D. AGUS, MD^{1,3}
SARA EINIS, MSN⁴
GARRY M. STEIL, PHD³

Outcome measure	Open loop	Closed loop	P
Nocturnal mean glucose (mg/dL)	209 ± 18	178 ± 10	0.18
Nocturnal time (h)			
<70 mg/dL	0.21 ± 0.15	0.17 ± 0.10	0.86
70–109 mg/dL	0.98 ± 0.48	1.1 ± 0.33	0.85
110–200 mg/dL	3.2 ± 0.77	5.3 ± 0.66	0.12
201–300 mg/dL	4.3 ± 0.99	3.2 ± 0.69	0.43
>300 mg/dL	1.3 ± 0.42	0.18 ± 0.08	0.035
Nocturnal AUC >200 mg/dL (mg/dL × h)	384 ± 84	162 ± 40	0.049

Feasibility of Outpatient Fully Integrated Closed-Loop Control

First studies of wearable artificial pancreas

BORIS P. KOVATCHEV, PHD¹
 ERIC RENARD, MD, PHD²
 CLAUDIO COBELLI, PHD³
 HOWARD C. ZISSER, MD⁴
 PATRICK KEITH-HYNES, PHD¹
 STACEY M. ANDERSON, MD¹
 SUE A. BROWN, MD¹
 DANIEL R. CHERNAVSKY, MD¹
 MARC D. BRETON, PHD¹
 ANNE FARRET, MD, PHD²

MARIE-JOSÉE PELLETIER, MD²
 JÉRÔME PLACE, MSC²
 DANIELA BRUTTOMESSO, MD, PHD³
 SIMONE DEL FAVERO, PHD³
 ROBERTO VISENTIN, MSC³
 ALESSIO FILIPPI, MD³
 RACHELE SCOTTON, MD³
 ANGELO AVOGARO, MD, PHD³
 FRANCIS J. DOYLE III, PHD⁵

Diabetes Care 36:1851–1858, 2013

Diabetes Assistant (DiAs)

Universities of Padova, Montpellier, Virginia and
 Sansum Diabetes Research Institute

DREAM Project Aim

To Evaluate the Efficacy and Safety of the MD-Logic
Artificial Pancreas System in Controlling the Blood Glucose
Levels of Patients with T1DM at Home

Schneider Children's
Medical Center of
Israel

Israel

University Children's
Hospital

Slovenia

Diabetes-Zentrum für
Kinder und Jugendliche
Kinderkrankenhaus auf
der Bult

Germany

MD-Logic Artificial Pancreas System

- Medical team **fuzzy logic**
- **Basal / Bolus** approach
- **Individualized** & Learning system
- **Multi device** connectivity
- Remote **safety** monitoring

Atlas E et al, Diabetes Care 33(3):1072-6, 2010
Miller S et al, Diabetes Technol Ther 13:983-90, 2011

Fuzzy-Logic Applications

The MD-Logic Artificial Pancreas System

univerzitetni
Kinični center Ljubljana

COPYRIGHT: MORTEN INGEMANN

Fussy Logic Based, Closed Loop and Wireless System

DREAM Project: Overnight Closed-loop Control

DREAM4: **Overnight At Home**

Children, Adolescents & Young Adults

Pediatr Diabetes 2013 Aug 15. doi: 10.1111

Ongoing...

DREAM3: **Overnight At a Diabetes Camp**

Children & Adolescents (N=54)

N Engl J Med 2013 Feb 28;368(9):824-33

DREAM2: **Inpatient Overnight**

Children, Adolescents & Young Adults (N=15)

Pediatr Diabetes 2013;14:159-67

DREAM1: **Feasibility**

Adolescents & Young Adults (N=12)

Nimri R et al, *Diabetes Technol Ther*; 14:728-35, 2012

N ENGL J MED 368:9 NEJM.ORG FEBRUARY 28, 2013

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE

Nocturnal Glucose Control with an Artificial Pancreas at a Diabetes Camp

Moshe Phillip, M.D., Tadej Battelino, M.D., Eran Atlas, M.Sc.,
Olga Kordonouri, M.D., Natasa Bratina, M.D., Shahar Miller, B.Sc.,
Torben Biester, M.D., Magdalena Avbelj Stefanija, M.D., Ido Muller, B.Sc.,
Revital Nimri, M.D., and Thomas Danne, M.D.

ABSTRACT

Patients at a diabetes camp who were treated with an artificial-pancreas system had less nocturnal hypoglycemia and tighter glucose control than when they were treated with a sensor-augmented insulin pump. (Funded by Sanofi and others; ClinicalTrials.gov number, NCT01238406.)

Results: Primary Endpoints

	Time <60 mg/dl [Hour] median [IQR]	Total number of episodes <63 mg/dl	Mean overnight Glucose [mg/dl] median
Control	0 [0 to 27.5]	22	140.4
MD-Logic	0 [0] P=0.015	7 P=0.0027	126.4 NS

DREAM 3: Main Segment

Safety All 54 Patients from 3 Camps

- No severe side effect
- No episodes of severe hypoglycemia
- No episodes of DKA

**MD-Logic Artificial Pancreas – DREAM at Home
Ljubljana, 21st October 2013**

**MD-Logic Artificial Pancreas – DREAM at Home
Ljubljana, 21st October 2013**

Klinični cen

**The DREAM Project
Where Are We Today?**

Reduce Glucose Variability (Within Patient)

DREAM 4 – Pilot at Home

Subject SS
Age = 25.1 yr
BMI = 26.5 kg/m²
HbA1c = 6.7%

MD-Logic AP DREAM Studies Where Are We Today?

- DREAM1 Feasibility¹
- DREAM2 Multicenter Inpatient²
- DREAM3 Multicenter Diabetes Camp³
- DREAM3+ Single Center Diabetes Camp
- DREAM4 Pilot home study
- DREAM4 Multicenter 4-Nights Home Study⁴
- DREAM4+ Single Center 6-Weeks Home Study

179 Patients
858 Nights at Home

**~ 15,000 hours of closed-loop
operation**

¹Nimri R et al, Diabetes Technol Ther; 14:728-35, 2012

⁵Phillip M et al, NEJM; 368:824-33, 2013

²Nimri R et al, Pediatr Diabetes, 14:159-67, 2013

⁶Nimri R et al, Pediatr Diabetes, Aug 2013 – Epub ahead of print

What do the patient think?

Today: DREAM 4- Over Night at Home – Matic 11y

Thank you

ATTD
Advanced Technologies & Treatments for Diabetes

**7TH INTERNATIONAL CONFERENCE
ON ADVANCED TECHNOLOGIES &
TREATMENTS FOR DIABETES**

**FEBRUARY 5-8, 2014
VIENNA, AUSTRIA**

Keep Me updated >>

Tell a Friend >>

www.kenes.com/attd

The banner features a blue background with a white line-art illustration of a classical building with columns and a statue on top. A red map of Austria is shown to the left of the building. The ATTD logo includes a yellow silhouette of a pancreas. Two buttons, one red and one blue, are positioned on the right side of the banner.

K. Weissenborn, Hannover

Hypoglykämie bei Typ 1 Diabetes – von Spatzen und Kolibris

Über Spatzen und Kolibris

Diabetes und ZNS

Karin Weissenborn

Foto: Rudloff

Foto: dpa

Neurometabolische Arbeitsgruppe
Neurologische Klinik

MHH
Metabolische Hochschule
Hannover

Fallbericht

Ein 85-jähriger Mann wird von seiner Ehefrau nach dem Mittagsschlaf mit einer Koordinationsstörung der rechten Körperhälfte und verwaschener Sprache aufgefunden. Pat. leidet seit zwei Tagen unter Durchfall und Erbrechen.

Vom Rettungsdienst wird eine Hypoglykämie von 49 mg% festgestellt und mit i.v.-Gabe von Glucose behandelt

Nach initialer Besserung sekundär erneutes Auftreten der Symptome. Daher V. auf Schlaganfall.

Neurometabolische Arbeitsgruppe
Neurologische Klinik

MHH
Metabolische Hochschule
Hannover

KH 141228

CCT bei Aufnahme

Neurometabolische Arbeitsgruppe
Neurologische Klinik

MHH
Metabolische Hochschule
Hannover

Fallbericht

Auf der Station zeigt sich eine schwere akute Chorea

BZ: 1,5 mmol/l

Ursache:

Rezidivierende Hypoglykämie unter Therapie mit Glimperid bei gleichzeitig bestehendem gastrointestinalem Infekt

Neuroendokrinologische Arbeitsgruppe
Neurologische Klinik

MHH
Medizinische Hochschule
Hannover

Hypoglykämie unter Sulfonyl-Harnstoff-Therapie

Amiel SA et al., Diab Med 2008; 25 (3): 245-254
Soderstrom et al. Emerg Med J 2006; 23:565-567

Sulfonyl-Harnstoffe
erhöhen die Insulin-Sekretion
reduzieren den Insulin-Metabolismus

Hypoglykämie-Rate: ca. 15 %/Jahr (BZ < 2.2. mmol/l)
symptomatische Episoden: 1 - 3.5 %

Cave:
prolongierte Hypoglykämie wegen langer Wirkdauer

Neuroendokrinologische Arbeitsgruppe
Neurologische Klinik

MHH
Medizinische Hochschule
Hannover

Hypoglykämie unter Sulfonyl-Harnstoff-Therapie

Mögliche Medikamenteninteraktionen

Verminderte renale Ausscheidung (Cave: Niereninsuffizienz)
ASS, Allopurinol

Verdrängung der Sulfonylharnstoffe von Albumin
ASS, Warfarin, Sulfonamide, Trimethoprim, Fibrate

Reduzierter Metabolismus der Sulfonylharnstoffe
Warfarin, Monoamin-Oxidase- Hemmer

Steigerung der Insulin-Sekretion
Nichtsteroidale Entzündungshemmer

Neuroendokrinologische Arbeitsgruppe
Neurologische Klinik

MHH
Medizinische Hochschule
Hannover

Drug-Induced Hypoglycemic Coma in 102 Diabetic Patients

Ben-Ami H. et al.; Arch Intern Med 1999; 159: 281-284

Identifizierte Risikofaktoren

Neurometabolische Arbeitsgruppe
Neurologische Klinik

MHH
Merkelstraße Hochschule
Hannover

Hypoglycemia-Induced Choreoathetosis Associated with Hyperintense Basal Ganglia Lesions in T1-Weighted Brain MRI

Wolz et al., Movement Disorders 2010; 25 (7): 966-968

Rezidivierende nächtliche Hypoglykämie (1.9 – 2.2 mmol/l) über 5 Tage, dabei progrediente Entwicklung einer Hemichorea, innerhalb von 6 Wochen reversibel
Korrelat der BG-Veränderungen ?

Neurometabolische Arbeitsgruppe
Neurologische Klinik

MHH
Merkelstraße Hochschule
Hannover

Hemichorea-Hemiballismus bei Hyperglykämie

Fallbeispiel

69-jährige Frau mit Typ-2-Diabetes, schlecht eingestellt (HbA1c 9.5%) entwickelt akut eine Hemichorea links, welche sich in den folgenden Tagen noch weiter verschlechtert

BZ bei Aufnahme: 348 mg % (19.3 mmol/l)

Chu, K. et al. Arch Neurol 2002;59:448-452.

Neurometabolische Arbeitsgruppe
Neurologische Klinik

MHH
Merkelstraße Hochschule
Hannover

Häufigkeit verschiedener neurologischer Symptome bei Patienten, die mit einer Hypoglykämie in eine Notaufnahme eingewiesen wurden

Table 1. Clinical Presentation

Presenting Symptom	No. of Patient Visits
Depressed sensorium	39
Coma	16
Stupor	10
Obtundation	10
Behavioral change	24
Confusion	14
Bizarre behavior	10
Dizziness, tremor	9
Seizures	3
Sudden hemiparesis	3
Total	125

82 %

N=125/12 Monate

Malouf R, Brust JCM: Hypoglycemia: causes, neurological manifestations, and outcome
Ann Neurol 17:421-430, 198

Neurometabolische Arbeitsgruppe
Neurologische Klinik

MHH
Mehringhiller Hochschule
Hannover

Truncation of the Krebs Cycle During Hypoglycemic Coma

Sutherland et al.; Medical Chemistry 2008; 4:379-385

Glukosemangel führt nicht zu einem Zusammenbruch des Energiestoffwechsels wie die Ischämie sondern zu einer Reduktion auf 25 - 30 % durch Nutzung anderer Substrate insbesondere Glutamin und Glutamat und Fettsäuren

Neurometabolische Arbeitsgruppe
Neurologische Klinik

MHH
Mehringhiller Hochschule
Hannover

Neuronale Nekrosen bei Hypoglykämie treten bevorzugt in liquornahen Regionen auf

Auer R.N., Siesjö, B.K. Ann. Neurol. 1988, 24: 699-707

6 min Ischämie

30min Null-Linien-EEG unter Hypoglykämie

Neurometabolische Arbeitsgruppe
Neurologische Klinik

MHH
Medizinische Hochschule
Hannover

Hypoglycemic brain damage

Auer RN; Forensic Science International 2004

MHH
Medizinische Hochschule
Hannover

Patientin wird bei Zwangsräumung der Wohnung komatös vorgefunden, hat offensichtlich gekrampft und fraglich auch aspiriert

BZ nicht messbar, Dauer der Hypoglykämie unbekannt

Multiple Einstiche in die Bauchdecke weisen auf Insulingabe in suizidaler Absicht hin

Pat. überlebt mit schwerem hirnorganischen Psychosyndrom

Neurometabolische Arbeitsgruppe
Neurologische Klinik

MHH
Medizinische Hochschule
Hannover

Auer RN et al.
Neuropathological findings in
three cases of profound hypoglycemia
Clin Neuropath 1989, 8:63-68

Neurometabolische Arbeitsgruppe
Neurologische Klinik

MHH
Medizinische Hochschule
Hannover

Auer RN et al.
Neuropathological findings in
three cases of profound
hypoglycemia
Clin Neuropath 1989, 8:63-68

Parietaler Cortex

Links:
nach hypoglykämischem
Coma

Rechts:
Normalbefund

Neurometabolische Arbeitsgruppe
Neurologische Klinik

MHH
Medizinische Hochschule
Hannover

Aus: Fujioka M et al.; STROKE 1997

Neurometabolische Arbeitsgruppe
Neurologische Klinik

MHH
Medizinische Hochschule
Hannover

- ### Nächtliche Hypoglykämien
- Warnsymptome:**
- ❖ Nachtschweiß
 - ❖ Alpträume
 - ❖ Kopfschmerzen beim Aufwachen
 - ❖ erschwertes Aufwachen
 - ❖ „Hangover“-Gefühl
 - ❖ „chronic fatigue“, Schlafstörungen
- Neuroendokrinologische Arbeitsgruppe
Neurologische Klinik
MHH Medizinische Hochschule Hannover

Serial diffusion and perfusion weighted MRI in transient hypoglycemia
 Cordonnier C et al., Neurology 2005; 65:175

2 hours after onset, NIHSS = 3
 4 hours after onset, NIHSS = 7
 12 hours after onset, NIHSS = 0

25-jährige bis dato gesunde Frau kommt mit **hochgradiger Hemiparese links**
 3 Monate zuvor 2 Krampfanfälle nach Schlafentzug
 Symptomatik verschlechtert sich zunächst, ist schliesslich aber komplett rückläufig
 Stroke-Abklärung ohne path. Befund
BZ: 2.2 mmol/l
 Nachweis eines Insulinoms

Neurometabolische Arbeitsgruppe
 Neurologische Klinik
 MHH Medizinische Hochschule Hannover

Reversible Injury of Internal Capsule and Splenium in a Patient with Transient Hypoglycemic Hemiparesis
 Kim et al., Cerebrovasc Dis 2006; 282-283

78-jährige Frau mit Typ II-Diabetes kommt mit **Somnolenz, Verwirrtheit, Dysarthrie und Hemiparese rechts**; BZ: 38mg%

a-e: MRI bei Aufnahme
 f-j: MRI 12 Stunden nach BZ-Ausgleich

Neurometabolische Arbeitsgruppe
 Neurologische Klinik
 MHH Medizinische Hochschule Hannover

Hypoglykämie und kardiovaskuläre Ereignisse

↑ CRP, ↑ VEGF, ↑ IL6
 INFLAMMATION
 HYPOGLYCEMIA
 ENDOTHELIAL DYSFUNCTION
 ↓ Vasodilation
 SYMPATHOADRENAL RESPONSE
 Hemodynamic Changes
 ↑ Adrenaline
 ↑ Contractility
 ↑ Oxygen Consumption
 ↑ Heart Workload
 BLOOD COAGULATION ABNORMALITIES
 ↑ Neutrophil Activation
 ↑ Platelet Activation
 ↑ Factor VII
 Rhythm Abnormalities
 Heart Rate Variability

DIABETES CARE, VOLUME 33, NUMBER 6, JUNE 2010

Dr. G. Helber
 Klinik für Gastroenterologie,
 Hepatologie und
 Endokrinologie
 MHH Medizinische Hochschule Hannover

Hypoglycaemic episodes and risk of dementia in diabetes mellitus: 7-year follow-up study

Lin CH & Sheu WHH; J Intern Med 2013; 273: 102–110.

Hypoglycaemic episodes and risk of dementia in diabetes mellitus: 7-year follow-up study

Lin CH & Sheu WHH; J Intern Med 2013; 273: 102–110.

Age and gender adjusted RR:
1.60 (95% CI 1.19–2.14, P = 0.002)

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit !

Foto: Rudloff

Foto: dpa

Neuroanatomische Arbeitsgruppe
Neurologische Klinik

T. Danne, Hannover

**Nicht nur Insulin – neue Medikamente zur Behandlung des
Typ 1 Diabetes**

Prof. Dr. Thomas Danne

DiabetesZentrum für Kinder und Jugendliche „AUF DER BULT“,
Hannover

ALLGEMEINE KINDERHEILKUNDE
DIABETOLOGIE, ENDOKRINOLOGIE,
KLINISCHE FORSCHUNG

Nicht nur Insulin – neue Medikamente zur Behandlung des Typ 1 Diabetes

Karl-Stolte-Seminar 2014

Nicht nur Insulin – neue Medikamente zur Behandlung des Typ 1 Diabetes

- Neue schnellwirkende Insuline
- Neue Basalinsuline
- Behandlung mit GLP-1 ?
- Behandlung mit SGLT-Hemmern?

Nicht nur Insulin – neue Medikamente zur Behandlung des Typ 1 Diabetes

- Neue schnellwirkende Insuline
- Neue Basalinsuline
- Behandlung mit GLP-1 ?
- Behandlung mit SGLT-Hemmern?

Wie kann man kurzwirksames Insulin schneller machen – BIODOL

Krasner A, et al. ADA 73rd Scientific Sessions Late Breaking Poster #44, 2013

A Review of a Family of Ultra-Rapid-Acting Insulins: Formulation Development

Alan Krasner, M.D., Roderike Pohl, Ph.D., Patrick Simms, Philip Pichotta, B.S., Robert Hauser, Ph.D., and Errol De Souza, Ph.D.

Wie kann man kurzwirksames Insulin schneller machen – BIODOL

Toleration Assessments of BIOD-123, BIOD-125, and LIS (mean ± SEM).

Variable	BIOD-123	BIOD-125	LIS
VAS	3.6 ± 2.1	6.8 ± 2.9*	1.8 ± 1.1
Absolute severity	0.26 ± 0.15	0.50 ± 0.19	0.17 ± 0.11
Relative severity	2.91 ± 0.25	3.08 ± 0.26	2.92 ± 0.08

*p < .05 vs LIS.

Figure 10. Pharmacokinetic profile of BIOD-123 and BIOD-125 vs LIS following SC administration to 12 patients with type 1 diabetes. Dose: 0.20 U/kg.

Journal of Diabetes Science and Technology
Volume 6, Issue 4, July 2012

Wie kann man kurzwirksames Insulin schneller machen – FIAsp

Insulin Aspart mit Zusätzen:

- Nicotinamide: soll Absorption beschleunigen
- Arginin: stabilisiert das Insulinmolekül

Insulin Aspart (Novorapid®)

Tresiba zugelassen in Europa, Japan und Mexiko

Zusammenfassung der Vergleiche von Insulin Degludec vs Glargine bei Typ 1 Diabetes über 104 Wochen

- Nächtliche Unterzuckerungen reduziert um 25%
- Vergleichbare Senkung des HbA1c
- Vergleichbare Nüchtern- und 9-Punkt Plasma Glucose-Profile
- Niedrigerer Insulinbedarf:
 - 12% weniger Basal Insulin
 - 9% weniger Gesamt-Tagesdosis
 - 6% weniger Bolus Insulin

Bode BW et al. Diabetic Medicine Published online: 17 Juni 2013

Pharmakokinetik von Degludec bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sehr ähnlich

Dashed line represents the lower limit of quantification
 T. Biester, S. Blaesig, K. Remus, B. Aschemeier, O. Kordonouri, C. Granhall, F. Søndergaard, A. Francisco, H. Haahr T. Danne. Ultra-long pharmacokinetic properties of insulin degludec in adults with type 1 diabetes is preserved in children and adolescents after single-dose administration. Pediatric Diabetes (2014) in press

IDeg vs. IGlar bei Diabetes: flexible Dosierung

Mathieu et al. J Clin Endocrinol Metab 98: 1154–1162, 2013

PEGylated Lispro – ein langwirksames Basalinsulin

FIG. 8. Pharmacodynamics of poly(ethylene glycolylated insulin lispro [poly(ethylene glycol) 20 kDa-B28 ($\geq \sim 95\%$)/A1 ($\leq \sim 5\%$)]-insulin lispro (LY) (0.225 mg/kg) versus insulin glargine (0.5 U/kg) in normal subjects without diabetes. Reproduced from www.freepatentsonline.com/y2009/0312236.html with permission.⁵⁰

Optimizing the Replacement of Basal Insulin in Type 1 Diabetes Mellitus: No Longer an Elusive Goal in the Post-NPH Era

LY2605541 vs Glargine

Rosenstock J. et al, Diabetes Care 2013;36(3): 522-528

LY2605541 vs Glargine

Hypoglykämie

	Baseline	Insulin Glargine	LY2605541	Relative Risk LY2605541 Insulin Glargine (95% CI)
Total Hypoglycemia Rate per 30 days	3.78 ± 3.92	7.36 ± 6.80	6.74 ± 7.70	1.12 (1.03, 1.23)
Nocturnal Hypoglycemia Rate per 30 days	0.46 ± 1.13	1.13 ± 1.42	0.88 ± 1.22	0.75 (0.62, 0.90)
Severe Hypoglycemia Events (patients)	–	6 (3)	6 (5)	–

Values are mean ± SD unless otherwise indicated.

Lipid- und Leberwerte

	Baseline	After 8 Weeks Insulin Glargine Treatment	After 8 Weeks LY2605541 Treatment	L/S Mean Difference of Change from Baseline (95% CI)	P-Value
HDL-cholesterol, mg/dL	80 ± 2	59 ± 2	54 ± 2	-5 (-7, -3)	<.001
LDL-cholesterol, mg/dL	96 ± 3	92 ± 3	102 ± 3	9 (3, 14)	.016
Triglycerides, mg/dL	91 ± 4	85 ± 4	113 ± 7	29 (19, 39)	<.001
ALT, IU/L, mean ± SD	21 ± 11	19 ± 10	27 ± 22	9 (5, 12)	<.001
AST, IU/L, mean ± SD	21 ± 9	20 ± 7	23 ± 12	4 (2, 6)	.001

A single patient experienced ALT $\geq 3 \times$ ULN after 8 weeks of LY2605541 and at 4 weeks follow-up. ALT was elevated ($\geq 1 \times$ ULN) at baseline. During the follow-up period, ALT was elevated only two and hepatic enzyme tests negative.

Rosenstock J. et al, Diabetes Care 2013;36(3): 522-528

Contrasting weight changes with LY2605541, a novel long-acting insulin, and insulin glargine despite similar improved glycaemic control in T1DM and T2DM

S. J. Jacober1,*, J. Rosenstock2, R. M. Bergenstal3, M. J. Prince1, Y. Qiu1, J. M. Beals1

Aims
The basal insulin analogue LY2605541, a PEGylated insulin lispro with prolonged duration of action, was previously shown to be associated with modest weight loss in Phase 2, randomized, open-label trials in type 2 (N=288) and type 1 (N=137) diabetes mellitus (T2DM and T1DM), compared with modest weight gain with insulin glargine. Exploratory analyses were conducted to further characterize these findings.

Methods
Pearson correlations between change in body weight and other variables were calculated. Continuous variables were analysed using a mixed linear model with repeated measurements. Proportions of subjects with weight loss were analysed using Fisher's exact test for T2DM and Nagekerke's method for T1DM.

Results
Weight loss was more common in LY2605541-treated patients than in patients treated with insulin glargine (T2DM: 56.9 vs. 40.2%, p=0.011; **T1DM: 66.1 vs. 40.3%, p<0.001**). More LY2605541-treated patients experienced ≥5% weight loss compared to patients treated with glargine (T2DM: 4.8 vs. 0%, p=0.033; T1DM: 11.8 vs. 0.8%, p<0.001). In both the T1DM and T2DM studies, weight change did not correlate with baseline body mass index (BMI), or change in HDL-cholesterol in either treatment group. No consistent correlations were found across both studies between weight change and any of the variables assessed; however, weight change was significantly correlated with hypoglycaemia rate in glargine-treated T2DM patients.

Conclusion
In two Phase 2 trials, improved glycaemic control with long-acting basal insulin analogue **LY2605541 is associated with weight loss** in previously insulin-treated patients. This weight change is independent of baseline BMI or hypoglycaemia.

Diabetes, Obesity and Metabolism Article first published online: 31 OCT 2013

Konzentrierte Basalinsuline sind im Kommen

Degludec U200

- enthält 2 Einheiten pro 0.01 ml (bzw. pro Teilstrich auf der Insulinspritze)

Glargine U300

- enthält 3 Einheiten pro 0.01 ml (bzw. pro Teilstrich auf der Insulinspritze)

U300 vs U100 Glargine bei Typ 2 Diabetes (EDITION I)

	Glargine U300	Glargine U100	RR	CI
ΔA1C at 6 months	-0.83%	-0.83%		-0.11-0.11
Any hypoglycemia	83.4%	88.6%	0.94	0.89-0.99
Any nocturnal hypoglycemia	45.3%	59.7%	0.76	0.66-0.87
Severe hypoglycemia	5.0%	5.7%		

Riddle MC et al. ADA June 21–25 2013; Chicago, IL, USA (Abstract 43-LB)

Nicht nur Insulin – neue Medikamente zur Behandlung des Typ 1 Diabetes

- Neue schnellwirkende Insuline
- Neue Basalinsuline
- Behandlung mit GLP-1 ?
- Behandlung mit SGLT-Hemmern?

Klassifikation von GLP-1 Rezeptoragonisten – Unterschiede im pharmakokinetischen Profil

GLP-1 Rezeptoragonisten können in zwei Klassen mit unterschiedlichem pharmakokinetischen Profil unterteilt werden:

Kurzwirksam	Langwirksam
Byetta® (Exenatide) – 2-mal täglich	Victoza® (Liraglutid) – 1-mal täglich
Lyxumia® (Lixisenatide) – 1-mal täglich	Bydureon® (Exenatide) – 1-mal wöchentlich
	Alogliptid – 1-mal wöchentlich
	Dulaglutid – 1-mal wöchentlich

zugelassene GLP-1 RA
 GLP-1 RA in Phase III

Galwitz B et al., Diabetologie 2012; 7: 290-301; Fachinformation Byetta®, Stand Juni 2012; Fachinformation Victoza®, Stand Oktober 2012; Fachinformation Bydureon®, Stand Juni 2011; Fachinformation Lyxumia®, Stand Februar 2013

Biologische Wirkungen kurzwirksamer GLP-1 Rezeptoragonisten

mod. nach: Meier JJ, Nat Rev Endocrinol. 2012 Dec; 8(12): 728-742

Original Article EP13065.06

LIRAGLUTIDE AS AN ADDITIONAL TREATMENT TO INSULIN IN OBESE PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS

Running Head: Liraglutide treatment in Type 1 Diabetes Mellitus

Wahq D, Kozakova M, MPP¹, Riva M, MZ², Muzika-Belina R³, Jara L, Lora P, Pateron J⁴, Andon P, Parnell G, Jensen M, MZ⁵, Parnell S, Andersen M, Pihl S, Pihl S⁶

Conclusions: Addition of liraglutide to insulin in obese patients with type 1 diabetes mellitus leads to improvement in glycaemic control, HbA1c and reduction in insulin dose, systolic blood pressure and body weight.

Acute metabolic effects of exenatide in patients with Type 1 Diabetes with and without residual insulin to oral and IV glucose challenges.

Ghazizadeh T, Rink L, Sherif J, Herold KC, Diabetes Care. 2013 Aug 15. [Epub ahead of print]

Conclusion: Exenatide showed a significant antidiabetogenic effect prior to an oral meal in patients with type 1 diabetes involving glucagon suppression and gastric emptying, while preserving increased insulin secretion. GLP-1 analogs may be useful as an adjunctive treatment in Type 1 diabetes.

Kombination mit Insulin bei Typ 1 Diabetes ?

Exenatide Treatment for 6 Months Improves Insulin Sensitivity in Adults with Type 1 Diabetes Mellitus.

Sarkar G, Alattar M, Brown RJ, Quon MJ, Harlan DM, Rother KI. Diabetes Care. 2013 Nov 5. [Epub ahead of print]

Conclusions: Exenatide is a promising adjunctive agent to insulin therapy due to its beneficial effects on postprandial blood glucose and insulin sensitivity in patients with type 1 diabetes.

Four Weeks of Treatment With Liraglutide Reduces Insulin Dose Without Loss of Glycemic Control in Type 1 Diabetic Patients With and Without Residual β -Cell Function

CONCLUSIONS—Treatment with liraglutide in type 1 diabetic patients reduces insulin dose with improved or unaltered glycaemic control.

Diabetes Care 34:1463-1468, 2011

16. Karl-Stolle-Seminar zur Pädiatrischen Diabetologie

Eine Dekade Karl-Stolle-Seminar: Tradition und Fortschritt

Programm

10. Januar und 11. Januar 2014
Courttyard Hotel und NDR-Funkhaus Hannover

Nicht nur Insulin – neue Medikamente zur Behandlung des Typ 1 Diabetes

- Neue schnellwirkende Insuline
- Neue Basalinsuline
- Behandlung mit GLP-1 ?
- Behandlung mit SGLT-Hemmern?

Wir danken folgenden Firmen für Ihre Unterstützung (Stand bei Drucklegung):

**AUF
DER
BULT**

KINDER- UND
JUGEND-
KRANKENHAUS

Veranstalter:

Kinder- und Jugendkrankenhaus
AUF DER BULT
Diabetes-Zentrum für Kinder und
Jugendliche
Janusz-Korczak-Allee 12
30173 Hannover

ALLGEMEINE KINDERHEILKUNDE
DIABETOLOGIE, ENDOKRINOLOGIE,
KLINISCHE FORSCHUNG