AINS Fortbildungen

**AUF
DER
BULT**

KINDER- UND
JUGEND-
KRANKENHAUS

Periphere Regionalanästhesieverfahren in der Kinderanästhesie

Michael Brackhahn

Abteilung Anästhesie, Kinderintensiv- und Notfallmedizin
Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult, Hannover

Interessenskonflikt?

Nein!

**AUF
DER
BULT**
KINDER- UND
JUGEND-
KRANKENHAUS

Periphere Regionalanästhesieverfahren in der Kinderanästhesie

Heute angesprochene Themen:

- Epidemiologie der Regionalanästhesie bei Kindern
- TAP-Block (transversus abdominis plane)
- Axillärer Plexus
- Distaler Ischiadikus Block (lateral)
- Ausbildung

Mit was behandeln wir Schmerzen?

Regionalanästhesie in der Versorgung

- Periphere Blockaden wann immer möglich
- Grad A Empfehlung
 - PWB bei Circumcision
 - Poplitealer Ischiadikus unterhalb Knie
 - Kaudale unterhalb Rippenbogen
- Grad B Empfehlung
 - Präoperativ Kaudale bei Badehosenchirurgie

Handlungsempfehlungen zur Regionalanästhesie bei Kindern*

Vom Wissenschaftlichen Arbeitskreis Kinderanästhesie der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI)

2006 – Überarbeitung von 2014 in Vorlage DGAI-Präsidium

Datenlage zu Regionalanästhesie in der Versorgung von Kindern

Pediatric Anesthesia 2010; 20: 1061–1069

doi:10.1111/j.1460-9592.2010.03448.x

Epidemiology and morbidity of regional anesthesia in children: a follow-up one-year prospective survey of the French-Language Society of Paediatric Anaesthesiologists (ADARPEF)

- > 31.000 Regionalanästhesien
 - 66% periphere Blockaden
 - < 3 Jahre 1:1 (zentral:peripher)
- 0,12% Komplikationen **Keine bleibenden Schäden**
 - zentral > peripher (Faktor 6!)

Ecoffey C, Lacroix F. et al *Pediatr Anesth* 20 (2010) 1061-9

Komplikationsraten Regionalanästhesie bei Kindern

Ecoffey C. et al Epidemiology and morbidity [...] (ADARPEF) *Pediatr Anesth* 20 (2010) 1061-9

Regionalanästhesie bei Kindern – Ist das sicher?

PRAN (Pediatric Regional Anesthesia Network) 2012

- 14.917 Blockaden
 - 95% unter Vollnarkose
 - 40% Kaudalanästhesie
 - 35% periphere Blockaden (70-80% unter US)
- Komplikationen
 - Single-shot < Katheter
 - Keine bleibenden Schäden / Tod

Polaner et al. PRAN: [...] Incidence of Complications [...] *Anesth Analg* 2012;115:1353-67

Periphere oder zentrale Blockaden?

Argumente für periphere Blockaden

- Weniger Nebenwirkungen / geringeres Risikoprofil
- Weniger systemische Resorption
- Anatomie häufig leichter darstellbar / zugänglich
- Zielgerichtete Therapie des OP Gebiets
- Weniger LA
- Mehr Blockadetechniken, die ohne US zu viele Gefahren bergen

Marhofer P. et al Everyday regional anesthesia in children *Pediatr Anesth* 22 (2012) 995-1001

Ecoffey C. SOS ALR Complications des blocs échoguidés – étude multicentrique de 27031 blocs axillaires *SFAR* 2013 R167

DGAInfo

Aus dem Wiss. Arbeitskreis
Regionalanästhesie und
geburtshilfliche Anästhesie

Handlungsempfehlung: Nervenlokalisierung zur peripheren Regionalanästhesie

T. Steinfeld¹ · U. Schwemmer² · T. Volk³ · W. Gogarten⁴ · M. Neuberger⁵ ·
T. Wiesmann⁶ · A. R. Heller⁷ · O. Vicent⁷ · A. Stanek⁸ · M. Franz⁹ · P. Kessler¹⁰

- Sonografie zur Darstellung von Begleitstrukturen bei tiefen Blockaden empfohlen
- Bei fraglicher Nadelposition in der Stimulationstechnik
→ Ultraschall
- Keine höhere Erfolgsrate oder Verringerung von intraneuralen Punktionen bei Kombination von elektrischer Nervenstimulation und Ultraschall

© Anästh Intensivmed 2013;54:662-666 Aktiv Druck & Verlag GmbH

Ultraschall in der Regionalanästhesie bei Kindern - Vorteile

Regionalanästhesie unter Vollnarkose ist der Versorgungsstandard in der Kinderanästhesie

Ecoffey C. Safety in pediatric regional anaesthesia *Pediatr Anesth* 22 (2012) 25-30

Ultraschall in der Regionalanästhesie bei Kindern - besser?

Verringerung der LA Menge = Erhöhung der Sicherheit

Technik	Ultraschall ml/kg KG	Landmarken ml/kg KG
Supraclaviculär	0,3	0,5
Infraclaviculär	0,2	0,5
Ischiadikus	0,2	0,3
Femoralis	0,15	0,3
Rektusscheiden	0,1 (je Seite)	0,3
Ilio-Inguinalis	0,1 (je Seite)	0,4

Ecoffey C. Safety in pediatric regional anaesthesia *Pediatr Anesth* 22 (2012) 25-30

Periphere Regionalanästhesieverfahren in der Kinderanästhesie

- TAP-Block (transversus abdominis plane)
- Axillärer Plexus
- Distaler Ischiadikus Block (lateral)
- Ausbildung

TAP = Transversus Abdominis Plane Block

Sensible Innervation der Bauchwand

Suresh S, Chan VWS. Ultrasound guided transversus abdominis plane block in infants, children and adolescents: a simple procedural guidance for their performance. *Pediatr Anesth* 2009; 19:296-299.

Indikationen für den TAP-Block

- jede Laparotomie / Laparoskopie
 - Appendektomie
 - Cholecystektomie
 - Funduplicatio nach Nissen
- Hernienchirurgie
- Colostomaanlage / -verschluß
- Schmerztherapie bei hohem Analgetikabedarf

TAP = Transversus Abdominis Plane Block

Alter: 13 Monate

AUF DER BULT
KINDER- UND JUGEND-KRANKENHAUS

M. obliquus externus abdominis (MOE)
M. obliquus internus abdominis (MOI)
M. transversus abdominis (MTA)

© Brackhahn

TAP-Block – 22kg linke Seite – SonoTAP Nadel 22G 80mm

2015Jan09 13:04

Aufi MB

Mus HFL
94%
MI 0,7
TIW 0,1

Patient
Auto Opt
Aufi
Clip
Seite 1/3

Vstk Tiefe Fixieren Speichern Optionen Modus

© Brackhahn

Axillaris-Block

Photos: © Hillmann / Döffert: Praxis der anästhesiologischen Sonografie – U&F 2009

Indikationen für Axillaris Block

- Eingriffe Unterarm
- Eingriffe Hand
- Eingriffe distaler Humerus
- Ellenbogen
- Schmerztherapie bei Oberarmschaftfrakturen

Axillaris-Block

Alter: 6 ½ Jahre

Alter: 2 ½ Jahre

Photos: © Hillmann / Döffert: Praxis der anästhesiologischen Sonografie – U&F 2009

Poplitealer Ischiadikus Block Lateraler Zugang

AUF DER BULT
KINDER- UND
JUGEND-
KRANKENHAUS

2008 Feb 20 09:20
Aufli S
MB
Nrv
HFL
100%
MI 0,7
18
A
B
2,7

MBF MSM F 2,7

Photos: © Hillmann / Döffert: Praxis der anästhesiologischen Sonografie – U&F 2009

Indikationen für poplitealen Ischiadikusblock

- Schmerztherapie bei Unterschenkelfrakturen
- Eingriffe am distalen Tibiaschaft
- Fußchirurgie
- Außenknöchel
- Schmerztherapie Fraktur Innenknöchel

Poplitealer Ischiadikus Block Lateraler Zugang

Photos: © Hillmann / Döffert: Praxis der anästhesiologischen Sonografie – U&F 2009

Poplitealer Ischiadikusblock – lateraler

© Drs. Krone, Diba, Bye, Queen Victoria Hospital, East Grinstead – Quelle: youtube

Poplitealer Ischiadikusblock – lateraler Zugang, kurze Achse, in Plane – G25 50mm

© Brackhahn

Wo injizieren wir?

EPINEURIUM
Interfascicular epineurium
Epineurium sheath

NERVE FASCICLE
Axon
Endoneurium
Perineurium

artery, nerve, needle

cephalic vein, axillary artery, ulnar nerve

a Needle in nerve with swelling

c Needle removed with nerve swelling and halo

Bigeleisen P et al Nerve puncture and apparent intraneural injection [...]. Anesthesiology 2006; 105:779-83

Was passiert, wenn wir intraneural injizieren?

Am Beispiel des distalen Nervus Ischiadicus

- Nervenstimulation mit geringer Stromstärke (0,3 – 0,4mA)
- 16 von 17 mit intraneuraler, sub-epineuraler Injektion
- keine klinischen oder neurophysiologischen Ausfälle

Kein Rückschluss möglich:

- andere Lokalanästhetika (1,25% Mepivacain + KM)
- Adjuvantien
- Nadeltypen
- anderer Nerven Aufbau

Sala-Blanch X. et al No [...] evidence of nerve injury after intraneural injection [...]. Anesthesiology 2011; 115:589-95

Intraneurale Injektion

Am Beispiel des distalen Nervus Ischiadicus

Robards et al Anesth Analg 2009:

- Bei 24 Patienten intraneurale Lage der Nadel im US
 - bei 4 Pat. dennoch keine Stimulation bei 1,5mA
- Anschwellen bei Injektion
- keine Schäden / Ausfälle

Nerve diameter before injection (mm)	Nerve expansion (%)	Minimum current (mA) in patients with motor response
6.4	75	0.40
7.1	69	0.42
7.6	61	0.40
7	41	0.35
8.9	40	0.40
8.4	39	0.55
6.1	74	0.40
7.2	40	0.45
8.8	38	0.45
8.1	37	0.40
6.8	44	0.40
7.1	51	0.75

Robards et al Intraneural Injection [...] popliteal sciatic nerve block - *Anesth Analg* 2009;109:673-7

Ausbildung – Ein Problem?

Fig 1. Distribution of errors committed. There were a total of 398 errors. Error 1 (43.7%) = needle not visualized while being advanced. Error 2 (11.6%) = inadequate equipment preparation. Error 3 (4.7%) = neural target mal-positioned on ultrasound screen. Error 4 (26.9%) = unintentional probe movement. Error 5 (3.5%) = awkward needle holding. Error 6 (1.7%) = watching hands instead of ultrasound image. Error 7 (7.8%) = poor ergonomics.

Sites et al. Characterizing Novice Behavior [...] Learning US-Guided Peripheral Regional Anesthesia *Reg Anesth Pain Med* 2007;32:107-115

Ausbildung – Ein Problem? Am Beispiel des distalen Nervus Ischiadicus

Sites et al. Characterizing Novice Behavior [...] Learning US-Guided Peripheral Regional Anesthesia *Reg Anesth Pain Med* 2007;32:107-115

Ultraschall in der Regionalanästhesie bei Kindern – Ausbildung!

Lehr-Konzept

- Blockaden 1 Tag prä-op identifizieren
- Beratung mit Weiterbildungsassistenten bzw. Kollegen zur Ausbildung in RA
- Beratung mit Chirurgen über Blockadetechnik

1. Schritt

2. Schritt

- Beratung mit Chirurgen / Patienten / Eltern
- Einwilligung in Verfahren
- Aufschreiben von Spezifitäten des Punktionsortes

- Ausrüstung und Geräte im OP-Raum vorbereiten
- Blockade nach Einleitung
- Nachuntersuchung im Aufwachraum bzgl. zusätzlicher Analgesie

3. Schritt

Marhofer P. et al Everyday regional anesthesia in children *Pediatr Anesth* 22 (2012) 995-1001

Hygiene bei der Punktion

- Sterile Abdeckung des Schallkopfes bei single-Shot
- Sterile Abdeckung von Schallkopf und –kabel bei Katheterverfahren
- Bei Katheterverfahren:
 - Steriler Tisch
 - Sterile Einkleidung des Anwenders
 - Großflächige sterile Abdeckung

Photos: © Hillmann / Döffert: Praxis der anästhesiologischen Sonografie – U&F 2009

Maximaldosen der Lokalanästhetika

- Bupivacain: 2,5 mg/kg
- Lidocain: 5 mg/kg
- Ropivacain: 3 - 4 mg/kg (kontinuierlich: 3mg/kg/6h)
- Mepivacain: 5 mg/kg
- Prilocain: 5 mg/kg (Met-Hb Bildner)

Bei Kindern unter 10kg und kardial vorerkrankten Kindern sowie Frühgeborenen empfiehlt sich eine Dosisreduktion um 25%

Zusammenfassung Regionalanästhesie in der Kinderanästhesie

- Bei (Klein-)Kindern immer unter Vollnarkose
- reduziert Analgetikabedarf (intra- und postoperativ)
- erhöht den Patientenkomfort
- US erhöht die Sicherheit auf mehreren Ebenen
- Beschränken auf wenige Verfahren, diese aber regelmäßig
- Standards (SOP)
- Maximalmengen beachten – immer LA Menge berechnen
- Hygiene nicht vergessen – auch bei single-shot Technik

Noch Fragen?

www.auf-der-bult.de brackhahn@hka.de www.euroespa.com

Jahrestreffen

10. & 11. Juni 2016 in Hannover

Verbrauchsmaterial für jede Punktion

- Kaudalset zum Abwaschen
- Spritze(n)
- Kanüle zum Aufziehen
- Sterile Handschuhe
- Braunoderm® bzw. Softasept® (< 1 Jahr)

• Bei Kathetereinlage:

- Steriler Kittel
- Klebelochtuch (Vygon mit Fenster)
- Skalpell (spitz)
- 17 G Tunnelbraunüle (PDK)
- Folienpflaster & Medipore (Tapete)

+

Nervenblockaden mit Sonographie

- Plexus-Nadel (G25 50mm oder G21 100mm)
- steriler Schallkopfüberzug (CivFlex®, blau) oder
- Steriles Sono-Gel (Einzelpäckchen à 20g)
- Sterile Abdeckung für Schallkopf (Klebefolie: Tegaderm® 1626W)

Material für Regionalanästhesie

Kaudalanästhesie

Epican Paed® (Kaudalkanüle):

- 25 G (orange) bis ca. 10kg
- 22 G (schwarz) ab ca. 10kg

Epiduralanästhesie (PDK, Kaudalkatheter)

Arrow Epidural-Set® 19 oder 20 G Katheter

Nervenblockaden ohne Sonographie

Plexufix®-Kanüle 24 G, 50mm

Medikamente:

- Epiduralkatheter: Ropi 0,2% plus Sufenta 0,5 µg/ml
- Femoralis-Block: Ropi **0,3%** 0,3 ml/kg
- Ilioinguinalis-Block: Ropi 0,2% 0,4-0,5 ml/kg
- Kaudalanästhesie: Ropi 0,2% 1,0-1,5 ml/kg
- Kaudalanästhesie > 6 Mon.: plus Clonidin 2 µg/kg
- Mono-Kaudale mit Sedierung: Ropi **0,3%** 1 ml/kg
- Peniswurzel-Block: Bupivacain 0,5% 0,1 ml/kg/Seite
- Plexus axillaris-Block: Ropi **0,3%** 0,5-0,7 ml/kg
- Poplitealer Ischiadicus-Block: Ropi **0,3%** 0,1-0,2 ml/kg
- Rektusscheiden-Block: Ropi 0,2% 0,5 ml/kg/Seite
- TAP-Block: Ropi 0,2% 0,3-0,5 ml/kg/Seite

Brackhahn/Guericke/Eich – Anä KKB 03/2013